


211
510



401 a 500 sternig

craterigae


V

DU VOL, ET DE SES DIFFÉRENTES ESPÈCES.

313

tetés envers les personnes qui ont souffert de la transplantation, ou suppression des bornes. Au surplus, ces Peines doivent avoir également lieu, tant contre ceux qui ôtent ou arrachent des Bornes, que contre ceux qui les transportent.

(1) *V. AUTOMNE*, en la Conférence du Droit François, sur le titre *funum regundor.* au ff. *de s'explicque ainsi* : *Peine de Termino moto ut carere omnes in universa Gallia, permittuntur arbitrio judicantium, aliquando verberibus ceditur, & in exilium mittitur. Ut ait Brissonius.*
(2) Ceux qui ôtent ou arrachent Bornes sciemment, & ceux qui mettent fausses Bornes, doivent être punis comme Larrons. *CUT. de BRETAGNE, art. 635.*



lont
6. Quid;
deceux qui
arrachent
les Bornes
qui sont
mises dans
les bois.

nt la Caroline, il faut considérer les pour la punition de ce Crime. re de la chose, la Qualité de la 2, & le Danger ou préjudice qui en qui par malice & avec danger déplace, re ou altère une borne, sera puni en son proportion du danger qui en résulte, & nature de la chose & de la personne, après consulté. *ORD. de CHARLES-QUINT,*

(1) Pour effallons, baliveaux, paroit, arbres de lliere, & autres arbres de réserve, cinquante livres, pour pied-cornier marqué de notre martreau, abattu, cent livres, & deux cens livres pour pied-cornier arraché & déplacé; à raison du lieu néanmoins l'Amende pour baliveaux de l'âge du raiils au-dessus de vingt ans, à dix livres. *ORD. des Haux & Forêts, art. 4. tit. des Peines & Amendes.*
(2) Ordonnons que dans les angles ou coins des places, croisées, rivières ou biviaires qui se ren-Forêts, nos Officiers des Matières feront incessamment planter des croix, poteaux ou pyramides à nos frais, & Bois qui Nous appartiennent; & pour les autres, aux frais des Villes les plus voisines & intéressées, avec inscriptions & marques apparentes du lieu où chacun conduit, sans qu'il soit permis à

V.

I V.

s Hadrianus in hac v factum sit eorum c cs propulerunt dubi en modis ex cond nitis magis statui po arione sunt, quae pandorum alienorum : & possunt in temp , relegati : id est, iacilius. Si vero alii rio fundi sunt : ca ri. Quod si per igno aut sunt, sufficiat eos e Term. moto.

Jan. 1826.

TABLEAU
ENCYCLOPÉDIQUE
ET MÉTHODIQUE

DES TROIS RÉGNES DE LA NATURE.

BOTANIQUE.

TOME SECOND.

PAR le Citoyen LAMARCK.



A PARIS,

Chez PANCKOUCKE, Imprimeur-Libraire, rue des Poitevins. N°. 13.

M. DCC. XCIII.

A V I S.

LES Souscripteurs ne doivent faire relier aucune des parties de ces Planches d'Histoire Naturelle ; les discours qui accompagnent plusieurs livraisons déjà publiées , n'étant pas terminées. Lorsque les Planches qui représentent les Animaux seront finies , & nous espérons qu'elles le seront cette année , nous indiquerons toutes celles qui doivent aller de suite , pour ne former qu'un volume à l'*instar* de ceux des Arts & Métiers mécaniques. Le discours doit être aussi relié séparément & dans l'ordre que nous indiquerons.

Nota. C'est par erreur que dans la quarante-quatrième livraison , le frontispice du premier volume de cette matière porte PREMIERE LIVRAISON ; lisez TOME PREMIER.

316. BROSSÉ.

Charact. essent.

CAL. charnu, 5-fide. Cor. tronquée. Capf. à 5 loges, polysperme.

Charact. nat.

Cal. monophylle, charnu, quinquefide : à découpures oblongues, acuminées, droites, de la longueur de la corolle.

Cor. monopétale, conoïde, tronquée au sommet, entière.

Etam. Cinq, enfermées dans la corolle.

Pist. Ovaire supérieur ? pentagone. Style subulé, plus court que la corolle. Stigm. simple.

Péric. Capsule arrondie, marquée de cinq sillons, à cinq loges, recouverte par le calice persistant, grandi, charnu, connivent, ouvert par les côtés.

Sem. nombreuses, très-petites.

Tableau des espèces.

2261. BROSSÉ écarlatte. Diâ. 1. p. 470.

L. n. les bois de Saint-Domingue. *h* *Arbrisseau* de 3 ou 4 pieds.

317. ARGOPHYLLE.

Charact. essent.

CAL. 5-fide. 5 pétales. Tube intérieur pyramidal, 5-gone, tronqué. Capf. semi-inférieure, 3-loculaire.

Charact. nat.

Cal. court, quinquefide : à découp. pointues.

Cor. Cinq pétales, lancéolés, trois fois plus longs que le calice, ouverts.

Tube intérieur pyramidal, pentagone, tronqué, ouvert au sommet, formé de filets nombreux, connivens, réunis dans leur partie inf.

Etam. Cinq filaments, subulés, attachés au réceptacle, enfermés dans le tube. Anthères ovales.

Botanique. Tome II.

316. BROSSÆA.

Charact. essent.

CAL. carnosus, 5-fidus. Cor. truncata. Capf. 5-locularis, polysperma.

Charact. nat.

Cal. monophyllus, carnosus, quinquefidus : laciniis oblongis, acuminatis, erectis, longitudine corollæ.

Cor. monopetala, conica, apice truncata, integra.

Stam. Quinque, inclusa.

Pist. Germen superum ? pentagonum. Stylus subulatus, corolla brevior. Stigma simplex.

Peric. Capsula subrotunda, quinque fulcis divisa, quinquelocularis, tecta calyce persistente, ampliata, carnosio, connivente, lateribus pervio.

Sem. Plurima ; minutissima.

Conspectus specierum.

2261. BROSSÆA coccinea. T. III.

Ex sylvis Domingi. *h* *Plum. Gen.* 5. *Burm.* *Amer. t.* 64. *f.* 2.

317. ARGOPHYLLUM.

Charact. essent.

CAL. 5-fidus. Petala 5. Tubus interior pyramidatus, 5-gonus, truncatus. Capf. semi-infera, 3-locularis.

Charact. nat.

Cal. brevis, quinquefidus : laciniis acutis.

Cor. Petala quinque, lanceolata. Calyce triplo majora, patentia.

Tubus interior pyramidalis ; pentagonus, truncatus, apice pervius, constans ex capillis plurimis, conniventibus, basi connatis.

Stam. Filamenta quinque, subulata, receptaculo inserta, tubo inclusa. Anthæræ ovatæ.

A

2 PENTANDRIE MONOGYNIE.

Pist. Ovaire demi-inférieur, turbiné, plane en-dessus. Style filiforme, de la longueur du tube. Stigmate globuleux.

Péric. Capsule semi-inférieure, hémisphérique, aplatie en-dessus, triloculaire, s'ouvrant de trois côtés.

Sem. nombreuses, arrondies, poreuses.

Tableau des espèces.

2262. ARGOPHYLLE *luisant*. Dict. 1. p. 248.
L. n. la Nouvelle-Calédonie. *Arbriff. joyeux*.

Explication des fig.

Pl. III. ARGOPHYLLE *luisant*. (a, b) Fleur entière. (c) Calice avec le tube intérieur. (d) Pétale séparé. (e) Tube intérieur, coupé, montrant les étamines. (f) Le même grossi. (g) Étamine. (h) Style, stigmate. (i) Capsule. (k) La même grossie & coupée.

318. LICIE T.

Charact. essent.

CAL. court, à 3 ou cinq dents. *Cor.* tubuleuse. Étamines velues à leur base. Baie 2-loculaire, polysperme.

Charact. nat.

Cal. monophylle, court, persistant, droit, à trois ou cinq découpures.

Cor. monopétale, infundibuliforme. Tube cylindracé, plus long que le calice, un peu courbé. Limbe quinquefide, ouvert.

Etam. Cinq filaments, subulés, attachés au tube de la cor., velus à leur base. Anth. arrondies.

Pist. Ovaire supérieur, arrondi. Style filiforme, plus long que les étamines. Stigmate bifide, un peu épais.

Péric. Baie arrondie ou ovale, biloculaire.

Sem. Plusieurs, réniformes, attachées à la cloison épaissie dans son milieu.

Tableau des espèces.

2263. LICIE T *d'Afrique*. Dict. n°. 1.
L. épineux, à feuilles fasciculées, linéaires, rameaux roides.
L. n. l'Afrique. *h F. petites, étroites, &c.*

PENTANDRIA MONOGYNIA.

Pist. Germen semi-inferum, turbinatum, supra planum. Stylus filiformis, longitudine tubi. Stigma globosum.

Peric. Capsula semi-infera, hemisphaerica, supra plana, trilocularis, trifariam dehiscens.

Sem. Plurima, globosa, porosa.

Conspectus specierum.

2262. ARGOPHYLLUM *nitidum*. T. III.
E Nova-Caledonia. *Forst. Gen. 15. L. f. suppl.*

Explicatio iconum.

Tab. III. ARGOPHYLLUM *nitidum*. (a, b) Flos integer. (c) Calyx cum tubo interiori. (d) Petalum separatum. (e) Tubus interior dissectus, stamina exhibens. (f) Idem ampliatus. (g) Stamen. (h) Stylus, stigma. (i) Capsula. (k) Eadem aucta & dissecta. *Fig. ex D. Forst.*

318. LYCIUM.

Charact. essent.

CAL. brevis, 3 f. 5-dentatus. *Cor.* tubulosa. Stamina basi villosa. Bacca 2-ocularis, polysperma.

Charact. nat.

Cal. monophyllus, brevis, erectus, persistens, trif. quiquefidus.

Cor. monopetala, infundibuliformis. Tubus cylindraceus, calyce longior, subincurvus. Limbus quiquefidus, patulus.

Stam. Filamenta quinque, subulata, tubo corollæ inserta, basi villosa. Anth. subrotundæ.

Pist. Germen superum, subrotundum. Stylus filiformis, flaminibus longior. Stigma bifidum, crassiusculum.

Peric. Bacca subrotunda, vel ovata, bilocularis.

Sem. Plura, reniformia, dissepimento medio incrassato affixa.

Conspectus specierum.

2263. LYCIUM *Afrum*. T. III. f. 1.
L. spinosum, foliis fasciculatis, linearibus; ramis strictis.
Ex Africa. *h Michel. Gen. 1. 105. f. 2.*

PENTANDRIE MONOGYNIE.

2264. LICINET de Chine. Di&t. n°. 2.
L. épineux, à feuilles presque ovales, pétioles; rameaux pendans; calices quinquesfidés.
L. n. la Chine. ̢ *Stylus plus long que les étam.*
2265. LICINET à feuilles étroites. Di&t. n°. 3.
L. épineux, à feuilles lancéolées; rameaux pendans; calice trifides.
L. n. la Chine, &c. ̢ *Calices à 2 ou 3 lobes.*
2266. LICINET d'Europe. Di&t. n°. 3.
L. épineux, à feuilles lancéolées, obliques, un peu charnues; rameaux flexueux, cylindriques.
L. n. l'Europe australe. ̢
2267. LICINET de Tartarie. Di&t. suppl.
L. épineux, à feuilles fasciculées, presque linéaires, charnues; rameaux couchés.
L. n. la Tartarie. ̢ *Arbriff. étalé, traînant.*
2268. LICINET Capsulaire. Di&t. n°. 5.
L. épineux, à feuilles lancéolées, minces, glabres; pédoncules & calices pubescens; péricarpes capsulaires.
L. n. le Mexique. ̢ *Cor. en roue.*
2269. LICINET glauque. Di&t. n. 6.
L. épineux, à feuilles arrondies-ovales, acuminées, glauques; panicules terminales.
L. n. le Pérou. ̢ *L. hétérophyll. murr.*
- * LICINET (tétrandre) épineux; à feuilles ovales, obtuses, charnues; rameaux anguleux, glabres; corolles quadrisfidés, tétrandriques. *Le Cap de Bonne-Espérance.*
- * LICINET (inerte) sans épines, glabre; à feuilles oblongues; fleurs ramassées, pédonculées, stipules barbuës. *Le Cap de B. Esp.*

Explication des fig.

Pl. 112. f. 1. LICINET d'Afrique. (a, b) Rameau composé, avec des fleurs. (c) Corolle entière, séparée. (d) La même ouverte. (e) Etamine. (f) Calice, style. (g) Pistil. (h) Baie entière. (i) La même coupée transversalement. (l) Semences séparées.
Pl. 112. f. 2. LICINET de Chine.

PENTANDRIA MONOGYNIA: 3

2264. LYCIUM *Chinense*. T. 112. f. 2.
L. spinosum, foliis subovatis, petiolatis; ramis dependentibus; calycibus quinquesfidis.
E China. ̢ *Stylus staminibus longior.*
2265. LYCIUM *barbarum*.
L. spinosum, foliis lanceolatis; ramis dependentibus; calycibus trifidis.
E China, &c. ̢ *Styl. vix longitudine staminum.*
2266. LYCIUM *Europæum*.
L. spinosum; foliis lanceolatis, obliquis, subcarnosis; ramis flexuosis, teretibus.
Ex Europa australi. ̢
2267. LYCIUM *Tataricum*.
L. spinosum, foliis fasciculatis, sublinearibus, carnosis; ramis decumbentibus.
E Tataria. ̢ *Pall. fl. Ross. t. 49.*
2268. LYCIUM *capsulare*.
L. spinosum, foliis lanceolatis, tenuibus; glabris; pedunculis calycibusque pubescentibus; pericarpis capsularibus.
E Mexico. ̢ *Cor. rotata.*
2269. LYCIUM *boerhaviaefolium*.
L. spinosum, foliis subrotundo-ovalibus, acuminatis, glaucis; paniculis terminalibus.
E Peru. ̢ *Ehretia . . . L'Herit. Stirp. t. 23.*
- * LYCIUM (tétrandre) spinosum; foliis ovatis, obtusis, carnosis; ramis angulatis, glabris; corollis quadrisfidis, tétrandris. *L. f. suppl.*
- * LYCIUM (inerte) inerme glabrum; foliis oblongis; floribus aggregatis, pedunculatis; stipulis barbatis. *L. f. suppl.*

Explicatio iconum.

Tab. 112. LYCIUM *Afrum*. (a, b) Ramus compositus, cum floribus. (c) Corolla integra, separata. (d) Eadem aperta. (e) Stamen. (f) Calyx, stylus. (g) Pistillum. (h) Bacca integra. (i) Eadem transversim secta. (l) Semina separata. *Fig. ex Mich. & ex Herb.*
Tab. 112. f. 2. LYCIUM *Chinense*.

4 PENTANDRIE MONOGYNIE.

319. CESTREA U.

Charact. essent.

CAL. court, à 5 dents. Cor. tubuleuse. Etam. glabres, avec une petite dent. Baie 2-locul. polysperme.

Charact. nat.

Cal. monophylle, tubuleux, très-court, à cinq dents, droites.

Cor. monopétale, infundibuliforme. Tube cylindracé, grêle, très-long : à orifice un peu dilaté. Limbe quinqueside, ouvert, court ; à découp. ovales, régulières

Etam. Cinq filamens, filiformes, attachés au tube de la corolle, munis d'une petite dent en leur milieu ou vers leur base. Anthères arrondies, à l'orifice.

Pist. Ovaire supérieur, cylindrique-ovale, de la longueur du calice. Style filiforme, de la longueur des étam. Stigmate un peu épais, obtus, à peine échancré.

Peric. Baie ovale, biloculaire (2-loculaire selon Linn. & Gärtn.)

Sem. Plusieurs, anguleuses, attachées à la cloison, qui est épaisse dans son milieu.

Tableau des espèces.

2270. CESTREAU nocturne. Dict. n°. 1.

C. à fleurs pédonculées, presque en grappe, verdâtres; filamens dentifères; baies blanches.

L. n. l'Amérique mérid. h

2271. CESTREAU du Chili. Dict suppl.

C. à feuilles étroites-lancéolées, garnies de stipules; fleurs presque en grappe, fasciculées, d'un jaune verdâtre; baies violettes.

L. n. le Chili h *Arbrist. fort rameux, de 3 à 4 pieds, subsist. en pleine terre en notre climat.*

2272. CESTREAU à oreillettes. Dict. n°. 2.

C. à fleurs pédonculées, presque paniculées; stipules en oreillette, entourant le rameau.

L. n. le Pérou. h *Voyez l'Hérit. Stirp. t. 35.*

2273. CESTREAU à baies noires. Dict. n. 3.

C. à fleurs fasciculées, presque sessiles : à limbe

PENTANDRIA MONOGYNIA.

319. CESTRUM.

Charact. essent.

CAL. brevis, 5-dentatus. Cor. tubulosa. Stam. glabra, cum denticulo. Bacca 2-locularis, polysperma.

Charact. nat.

Cal. monophyllus, tubulosus, brevissimus, quinquedentatus, erectus.

Cor. monopetala, infundibuliformis. Tubus cylindraceus, longissimus, tenuis : fauce subdilata. Limbus quinquefidus, patens, brevis; laciniis ovatis, æqualibus.

Stam. Filamenta quinque, filiformia, tubo corollæ inserta, in medio aut versus basim denticulo notata. Antheræ subrotundæ, intra faucem.

Pist. Germen superum, cylindraceo-ovatum, longitudine calycis. Stylus filiformis, longitudine staminum. Stigma crassiusculum, obtusum, vix emarginatum.

Peric. Bacca ovata, bilocularis. (2-locularis, ex Linn. & Gärtn.)

Sem. Plura, angulata, dissepimento medio incrassato affixa.

Conspectus specierum.

2270. CESTRUM nocturnum. T. 112. f. 1.

C. floribus pedunculatis, subracemosis, virescentibus; filamentis dentatis, baccis albis.

Ex Amer. merid. h *Dill. Elth. t. 153.*

2271. CESTRUM Parqui.

C. foliis angusto-lanceolatis, stipulatis; floribus subracemosis, fasciculatis, ex luteo virescentibus; baccis violaceis.

E Chili. h *Parqui Feuill. obs. 3. t. 32. C. parqui. L'Hérit. Stirp. 4. t. 36.*

2272. CESTRUM auriculatum.

C. floribus pedunculatis, subpaniculatis; stipulis auriculatis, ramulum cingentibus.

E Peru. h *Hediunda Feuill. obs. 3. t. 20. f. 3.*

2273. CESTRUM vespertinum.

C. floribus fasciculatis, subsessilibus; limbo

PENTANDRIE MONOGYNIE.

pointu ; baies enforme d'olive, d'un violet noir.

L. n. la Jamaïque , Saint-Domingue. *h* *Ixora Jacq.*

2274. CESTREAU à fleurs pâles. Dict. n. 4.
C. à grappes composées, axillaires ; fleurs petites, pâles ; feuilles ovales-oblongues, acuminées.
L. n. la Jamaïque, &c. *h* *Feuilles grandes.*

2275. CESTREAU à feuilles larges. Dict. suppl.
C. à grappes très-courtes ; axillaires ; feuilles ovales, glabres, rameaux & pétioles un peu tomenteux.
L. n. les pays chauds de l'Amérique. *h* *De M. Richard.*

2276. CESTREAU feuilles de laurier.
C. à fleurs presque sessiles, axillaires, fasciculées : à limbe obtus ; feuilles elliptiques, coriaces, très-glabres.
L. n. l'Amérique ? *Cestreau vénimeux.* Dict. n. 5.

2277. CESTREAU tomenteux. Dict. n. 7.
C. à fleurs ramassées, sessiles, terminales ; rameaux, feuilles & calices tomenteux.
L. n. l'Amérique mérid. *h*

2278. CESTREAU à fl. blanches. Dict. n. 8.
C. à faisceaux de fleurs pédonculés ; corolles blanches ; à limbe obtus, réfléchi ; feuilles ovales-lancéolées.
L. n. la Havanne. *h* *Le Galant de jour.*

2279. CESTREAU à f. opposées. Dict. suppl.
C. à feuilles opposées, lancéolées, nerveuses, un peu coriaces ; fleurs en faisceaux, sessiles, axillaires.
L. n. l'Afrique.

Explication des fig.

Pl. 112. f. 1. CESTREAU nocturne. (a, b) Sommité d'un rameau, avec les fleurs. (c) Corolle ouverte. (d) Etamine. (e) Calice, style. (f) Pistil. (a 2) Baie entière. (b 2) La même coupée transversalement. (c 2) Placenta mis à nud. (d 2) Situation des semences. (e 2) Semences vues de chaque côté. (f, g 2) Les mêmes coupées, avec la figure & la situation de l'embryon.

Pl. 112. Fig. 2. CESTREAU à feuilles opposées. On a mal représenté les fleurs.

PENTANDRIA MONOGYNIA. 5

acuto, baccis olivæformibus, è violaceo-nigris.

Ex Jamaica, Domingo. *h* *Burm. Amer. t. 157. f. 1.*

2274. CESTRUM pallidum.
C. racemis compositis, axillaribus ; floribus parvis pallidis ; fol. ovato-obl. acuminatis.

Ex Jamaica, &c. *h* *Sloan. Jam. 2. t. 204. f. 2.*

2275. CESTRUM latifolium.
C. racemis brevissimis, axillaribus ; foliis ovatis, glabris ; ramulis petiolisque subtomentosis.
Ex Amer. calid. *h* *An C. hirtum. Swartz. Prodr. 49.*

2276. CESTRUM laurifolium.
C. floribus subsessilibus, axillaribus, fasciculatis : limbo obtuso ; foliis ellipticis, coriaceis, glaberrimis.
Ex America ? *h* *Laureola . . . Pluk. t. 95. f. 1. C. laurifolium. l'Hérit. Stirp. t. 34.*

2277. CESTRUM tomentosum.
C. floribus confertis, sessilibus, terminalibus ; ramis foliis calycibusque tomentosis.
Ex Amer. merid. *h* *L. f. suppl. 150.]*

2278. CESTRUM diurnum.
C. florum fasciculis pedunculatis ; corollis albis ; limbo obtusoreflexo ; foliis ovato-lanceolatis.
Ex Havana. *h* *Dill. elth. t. 154.*

2279. CESTRUM oppositifolium. T. 112. f. 2.
C. foliis oppositis, lanceolatis, nervosis, subcoriaceis ; floribus fasciculatis, sessilibus ; axillaribus.
Ex Africa. *h* *D. Sonnerat.*

Explicatio iconum.

Tab. 112. f. 1. CESTRUM nocturnum. (a, b) Summitas ramuli, cum floribus. (c) Corolla aperta. (d) Stamen. (e) Calyx, stylus. (f) Pistillum. Fig. ex sicco. (a 2) Bacca integra. (b 2) Eadem transversum secta. (c 2) Recept. nudatum. (d 2) Seminum situs. (e 2) Semina ab utroque latere spectata. (f, g 2) Eadem dissecta, cum figurâ & situ embryonis. Fig. ex gartn.

Tab. 112. f. 2. CESTRUM oppositifolium. Flores malè depicti.

320. NICOTIANE.

Caraç. essent.

Cor. infundibuliforme, régulière, 5 fide. Etam. inclinées. Capf. biloculaire.

Caraç. nat.

Cal. monophylle, ovale, semi-quinquefide, persistant.

Cor. monopetale, infundibuliforme. Tube plus long que le calice. Limbe ouvert, semiquinquefide, à cinq plis.

Etam. Cinq filamens, subulés, presque aussi longs que la corolle, montans. Anthères oblongues.

Pist. Ovaire supérieur, ovale. Style filiforme, de la longueur de la corolle. Stigm. échancré.

Péric. Capsule ovale, ou ovale-conique, marquée d'une rainure de chaque côté, biloculaire, bivalve, s'ouvrant par le sommet. Placentas en demi-ovales, attachés à la cloison.

Sem. nombreuses, réniformes, ridées.

Tableau des espèces.

2280. NICOTIANE à tabac. Dict.

N. à feuilles lancéolées-ovales, sessiles, amplexicaules; fleurs à lobes pointus.

L. n. l'Amérique. ☉ *Fl. rouges.*

2281. NICOTIANE fruticueuse. Dict.

N. à feuilles lancéolées, subpétiolées, un peu decurrentes sur les côtés; tige frutescente à la base.

L. n. la Chine. ☿ *Fl. rouges.*

2282. NICOTIANE rustique. Dict.

N. à feuilles ovales, obtuses, pétiolées; fleurs obtuses.

L. n. l'Amérique. ☉ *Fl. d'un jaune pâle.*

2283. NICOTIANE paniculée. Dict.

N. à feuilles en cœur, très-entières, pétiolées; fleurs paniculées, obtuses, en masse.

L. n. le Pérou. ☉ *Corolle longue, d'un verd jaunâtre.*

320. NICOTIANA.

Charaç. essent.

Cor. infundibuliformis, regularis, 5-fida. Stam. inclinata. Capf. bilocularis.

Charaç. nat.

Cal. monophyllus, ovatus, semiquinquefidus, persistens.

Cor. monopetala, infundibuliformis. Tubus calyce longior. Limbus patulus, semiquinquefidus, quinqueplicatus.

Stam. Filamenta quinque, subulata, longitudine ferè corollæ, adscendentia. Antheræ oblongæ.

Pist. Germen superum, ovatum. Stylus filiformis, longitudine cor. Stigma emarginatum.

Peric. Capsula ovata, aut ovato-conica, utrinque linea insculpta, bilocularis, bivalvis, apice dehiscens. Receptacula dimidiato-ovata, punctata, dissipimento affixa.

Sem. numerosa, reniformia, rugosa.

Conspectus specierum.

2280. NICOTIANA tabacum. t. 113.

N. foliis lanceolato-ovatis, sessilibus, amplexicaulibus; floribus acutis.

Ex America. ☉ *Fl. rubri.*

2281. NICOTIANA fruticosa.

N. foliis lanceolatis, subpetiolatis, lateribus subdecurrentibus; caule basi frutescente.

E China. ☿ *An var. præcedentis?*

2282. NICOTIANA rustica.

N. foliis ovatis, obtusis. petiolatis; floribus obtusis.

Ex America. ☉ *Fl. pallidè lutei.*

2283. NICOTIANA paniculata.

N. foliis cordatis, integerrimis, petiolatis; floribus paniculatis, obtusis, clavatis.

E Peru. ☉ *Feuill. obs. 2. t. 10.*

PENTANDRIE MONOGYNIE.

2284. NICOTIANE *glutineuse*. Dict.
N. à feuilles en cœur, très-entières, pétiolées;
fleurs en grappe, unilatérales, courtes, irrégulières.
L. n. le Pérou. ☉ *Pl. très-visqueuse*.

2285. NICOTIANE *piquante*. Dict.
N. à feuilles en cœur, crénelées; grappes recourbées; tige hispide, piquante.
L. n. l'Amérique méridionale. ☿

2286. NICOTIANE *du Mexique*. Dict.
N. à feuilles oblongues-ovales, radicales; tige presque nue, fleurs en grappe, pointues.
L. n. la Vera-Cruz. F. étalées sur la terre.

2287. NICOTIANE *axillaire*. Dict.
N. pubescente, à feuilles un peu ovales, presque sessiles; pédoncules axillaires, uniflores; fleurs tubuleuses, obtuses.
L. n. Monte-Video. *Seroit-ce une Jaborose?*

- * NICOTIANE (*naine*) à feuilles ovales, sessiles; fleurs obtuses. *Petit tabac du Chili*.

Explication des figures.

Pl. 113. NICOTIANE à tabac. (a) Fleur entière (b) Calice. (c) Pistil. (d) Capsule entière. (e) La même s'ouvrant par le sommet. (f) La même coupée transversalement. (g) Semences séparées. (h) Superficie réticulée de la semence. (i) Embryon mis à découvert. (l) Sommité de la tige, avec les fleurs. (m) Feuilles caulinaires séparées.

321. STRAMOINE.

Charact. essent.

CAL. tubuleux, anguleux. Cor. infundibuliforme, plissée. Caps. sub4-loculaire.

Charact. nat.

Cal. monophylle, oblong, tubuleux, ventru, quinquangulaire, à cinq dents, caduc: à base presque orbiculée, persistante.

Cor. monopétale, très-grande, infundibuliforme. Tube cylindracé, presque plus long que le calice. Limbe subcampanulé, à cinq plis, obscurément à cinq lobes: à lobes acuminés.

PENTANDRIA MONOGYNIA. 7

2284. NICOTIANA *glutinosa*.
N. foliis cordatis, integerrimis, petiolatis; floribus racemosis, secundis, brevibus inæqualibus.
E. Peru. ☉ *Ad. Stock. 1753. t. 2.*

2285. NICOTIANA *urens*.
N. foliis cordatis, crenatis; racemis recurvatis; caule hispido, pruriginoso.
Ex America merid. ☿ *Burm. Amer. t. 211.*

2286. NICOTIANA *puffilla*.
N. foliis oblongo-ovalibus, radicalibus; caule subnudo; floribus racemosis, acutis.
E. Vera Cruce. *Mill. ic. 185. f. 2.*

2287. NICOTIANA *axillaris*.
N. pubescens, foliis subovatis, subsessilibus; pedunculis axillaribus, unifloris; floribus tubulosis, obtusis.
E. Monte-Video. *Commerf. Caps. 2-locularis.*

- * NICOTIANA (*minima*) foliis sessilibus, ovatis; floribus obtusis. *Molin. chil. p. 153.*

Explicatio iconum.

Tab. 113. NICOTIANA tabacum. (a) Flos integer. (b) Calyx. (c) Pistillum. Fig. ex Tournef. (d) Capsula integra. (e) Eadem apice dehiscens. (f) Eadem transversim secta. (g) Semina soluta. (h) Seminis superficies reticulata. (i) Embryo denudatus. Fig. ex Gartn. (l) Summitas caulis, cum floribus. (m) Folium caulinum separatum.

321. DATURA.

Charact. essent.

CAL. tubulosus, angulatus. Cor. infundibuliformis, plicata. Caps. sub4-locularis.

Charact. nat.

Cal. monophyllus, oblongus, tubulosus, ventricosus, quinquangularis, quinquedentatus, deciduus: basi suborbiculata persistente.

Cor. monopétale, maxima, infundibuliformis. Tubus cylindraceus, calyce fere longior. Limbus erecto-patulus, quinqueplicatus, obscurè quinquelobus: lobis acuminatis.

8 PENTANDRIE MONOGYNIE.

Etam. Cinq filamens, subulés, plus courts que la corolle, adnés à son tube. Anth. oblongues.
Pist. Ovaire supérieur, ovale. Style filiforme, droit, un peu plus long que les étamines. Stigmate un peu épais, obtus, à deux lames.
Péric. Capsule un peu charnue, ovale, échinée ou glabre, semi-quadriloculaire, posée sur la base du calice. Placentas saillans, épais, convexes, pondusés, attachés à la cloison.
Sem. nombreuses, réniformes.

Tableau des espèces.

* Capsules hérissées.

2288. STRAMOINE *féroce*. Di&. S. à capsules ovales, épineuses, droites; épines supérieures, très-grandes, convergentes. L. n. le Chine. ☉

2289. STRAMOINE *commune*. Di&. S. à capsules ovales, épineuses, droites; feuilles glabres, ovales, à beaucoup d'angles. L. n. l'Amér. maintenant commune en Europe. ☉ La pomme épineuse.

2290. STRAMOINE *pourprée*. Di&. S. à capsules ovales, épineuses, droites; feuilles glabres, anguleuses; tige pourprée. L. n. . . . ☉ Corolles bleuâtres.

2291. STRAMOINE *fastueuse*. Di&. S. à capsules globuleuses, tuberculeuses, penchées; feuilles anguleuses; tige d'un brun pourpré. L. n. l'Egypte. ☉ Cor. violette en-dehors, blanche en-dedans, & souvent double ou triple. Elle varie à capsule mutique.

2292. STRAMOINE *pubescente*. Di&. S. à capsules globuleuses, épineuses, penchées; calice cylindrique; feuilles presque entières, pubescentes. L. n. l'Inde, l'Afrique, ☉ Cor. blanche.

** Capsules lisses ou mutiques.

2293. STRAMOINE *lisse*. Di&. S. à capsules ovales, droites, inermes; tige herbacée. L. n. l'Afrique. ☉ Var. de la Str. commune?

PENTANDRIA MONOGYNIA.

Stam. Filamenta quinque, subulata, corolla breviora, tubo adnata. Antheræ oblongæ.
Pist. Germen superum, ovatum. Stylus filiformis, rectus, staminibus paulo longior. Stigma crassiusculum, obtusum, bilamellatum.
Péric. Capsula subcarnosa, ovata, echinata, aut glabra, semi-quadrilocularis, basi calycis imposita. Recept. feminum prominula, crassa, convexa, punctata, dissepimento affixa.
Sem. numerosa, reniformia.

Conspectus specierum.

* Capsulæ echinatae.

2288. DATURA *ferox*. D. capsulis ovatis, spinosis, erectis; spinis summis, maximis, convergentibus. E China. ☉ Barrel. ic. 1172.

2289. DATURA *stramonium*. T. 113. D. capsulis ovatis, spinosis, erectis; foliis glabris, ovatis, multangulis. Ex America, nunc vulg. per Europam. ☉ Gärtn. pag. 132.

2290. DATURA *ratula*. D. capsulis ovatis, spinosis, erectis; foliis glabris, angulatis; caule purpurascente. Ex . . . ☉ Fortè var. sequentis.

2291. DATURA *fastuosa*. D. capsulis globosis, tuberculatis, nutantibus; foliis angulatis, caule fusco-purpurascente. Ex Ægypto. ☉ Cor. extus violacea, intus alba, sæpe duplicata vel triplicata. Variat capsula mutica.

2292. DATURA *metel*. D. capsulis globosis, spinosis, nutantibus; calyce tereti; foliis subintegris, pubescentibus. Ex India, Africa. ☉ Pl. omnium fetidissima.

** Capsulæ læves s. muticæ.

2293. DATURA *lævis*. D. capsulis ovatis, erectis, inermibus; caule herbaceo. L. f. suppl. Ex Africa, ☉ Jacq. hort. 3, t. 82.

2294. STRAMOINE *en arbre*. Did.
S. à capfules globuleuses-ovales, inermes,
penchées; tige droite, arborecente.
L. n. le Pér. $\bar{\eta}$ *Le Floripondio*. Cor. pendantes.

2295. STRAMOINE *farmenteuse*. Did.
S. à capfules globuleuses-coniques, inermes;
tige fruticuleuse, farmenteuse, grimpante.
L. n. la Jamaïque, &c. $\bar{\eta}$ *Arbrisseau à tige*
farmenteuse, très-longue. Cor. blanche, lavée
d'une teinte pourpre. Limbe à lobes non acumi-
nés, mais crépus & frangés. F. velues légèrement
en-dessous & sur les bords.
 β . La même ? à f. très-glabres des deux côtés.

Explication des fig.

Pl. 113. Fructification de la Stramoine, d'après Tour-
nefort. (a) Fleur entière. (b) Corolle ouverte. (c) Ca-
lice. (d, e) Calice ouvert, pistil. (f) Ovaire. (g)
Capfulle entière. (h) La même coupée en travers (i)
Placentas mis à nud. (l) Semences séparées.

322. TRIGUÈRE.

Charact. essent.

Cor. campanulée, irrégulière. Godet stamini-
fère, à 5 dents. Baie sèche, à 4 loges. Sem.
gémées.

Charact. nat.

Cal. monophylle, femiquinqueside, persistant:
à découpures inégales, pointues.

Cor. monopétale, campanulée, irrégulière. Tube
court. Limbe ventru, plissé, plus long que
le calice, quinqueside : à deux découpures sup.
un peu réfléchies.

Etam. Cinq filaments, très-courts, dilatés & réu-
nis à leur base en un urcéole membraneux, à
cinq dents, environnant l'ovaire. Anthères
sagittées, conniventes.

Pist. Ovaire supérieur, arrondi, à deux fillons.
Style filiforme, droit, un peu plus long que
les étamines. Stigmate en tête.

Péric. Baie sèche, presque globuleuse, fillonnée,
quadriloculaire (quelquefois biloculaire.)

Botanique. Tom. II.

2294. DATURA *arborea*.
D. capfulis globofo-ovatis, inermibus, nu-
tantibus; caule arboreo, erecto.
E Peru. $\bar{\eta}$ *Feuill. obs. 2. t. 46. Cor. pendulæ.*

2295. DATURA *farmentosa*.
D. capfulis globofo-conicis, inermibus; caule
fruticoso, farmentoso, scandente.
Ex Jamaica, &c. $\bar{\eta}$ *Solandra grandiflora*.
Swartz. In act. Stockh. 1787. t. XI. Prodr.
p. 42. Caps. carnosæ, cortice crasso, subpul-
posa. F. subtus margineque leviter villosa.

β . *Eadem? foliis utrinque glaberrimis.*

Explicatio iconum.

Tab. 113. Fructificatio Daturæ. Ex Tournef. (a) Flos
integer. (b) Corolla aperta. (c) Calyx. (d, e) Calyx
apertus, pistillum. (f) Germen. (g) Capsula integra.
(h) Eadem transversim secta. (i) Recept. fem. denu-
data. (l) Semina separata.

322. TRIGUERA.

Charact. essent.

Cor. campanulata, irregularis. Cyathus stami-
nifer, 5-dentatus. Bacca sicca, 4-locularis.
Sem. bina.

Charact. nat.

Cal. monophyllus, femi-quinquesidus, persis-
tens : laciniis inæqualibus, acutis.

Cor. monopetala, campanulata, inæqualis. Tubus
brevis. Limbus ventricosus, plicatus, calyce
longior, quinquesidus : laciniis duabus supe-
rioribus, subreflexis.

Stam. Filamenta quinque, brevissima, basi dila-
tata & coalita in urceolum membranaceum,
quinquedentatum germi circumpositum. An-
theræ sagittatæ, conniventes.

Pist. Germen superum, subrotundum, bifidum.
Stylus filiformis, rectus, staminibus paulo
longior. Stigma capitatum.

Péric. Bacca sicca, subglobosa, sulcata, qua-
drilocularis (interdum bilocularis).

B

10 PENTANDRIE MONOGYNIE.

Sem. geminées, presque ovales, comprimées, un peu scabres, dont souvent une avorte.

Tableau des espèces.

2296. TRIGUERE musquée. Diâ.

T. à feuilles ovales-spatulées, dentées, un peu velues; pédoncules & calices laineux.

L. n. l'Espagne ☉ Cor. violette.

2297. TRIGUERE inodore. Diâ.

T. à feuilles ovales-lancéolées, très-entières, lisses; pédoncules & calices glabres.

L. n. l'Espagne. ☉ Je n'ai point vu cette espèce.

Explication des fig.

Pl. 114. TRIGUERE musquée. (a) Corolle vue en-devant. (b) La même vue par le côté. (c) Etamines. (d) Urceole des étamines. (e) Etamine séparée, avec l'anthere vue en-dedans. (f) Pistil. (g) Fruit dans le calice. (h) Le même mis à nud. (i) Le même coupé pour faire voir les loges. (l) Semence. (m) La même dépouillée de son écorce. (n) Partie supérieure de la tige, avec les feuilles & les fleurs.

322. * M A R K É E.

Charact. essent.

CAL. long, 5-fide. Cor. hypocratéris. à limbe obtus, presque régulier. Capf. cylindrique, 2-locul. polysperme.

Charact. nat.

Cal. monophylle, long, pentagone-prismatique, partagé au-delà de moitié en cinq découpures linéaires, lancéolées, aiguës, droites.

Cor. monopétale, hypocratérisforme. Tube cylindrique, plus long que le calice. Limbe ouvert, à cinq lobes, plus courts que le tube: lobes obtus, planes, presque égaux.

Stam. Cinq filamens, égaux, de la longueur du tube. Anthères à l'orifice.

Pist. Ovaire supérieur, oblong, se terminant en un style court. Stigmate.....

Péric. Capsule oblongue, cylindrique, un peu pointue, biloculaire, environnée par le cal.

Sem. nombreuses, cylindriques;

PENTANDRIA MONOGYNIA.

Sem. bina, subovata, compressa, scabriuscula, altero sæpe abortivo.

Conspectus specierum.

2296. TRIGUERA ambrosiaca. T. 114.

T. foliis ovato-spathulatis, ferratis, subvillosis: pedunculis calycibusque lanatis.

Ex Hispania. ☉ T. ambrosiaca. Cav. diff. 2.

2297. TRIGUERA inodora.

T. foliis ovato-lanceolatis, integerrimis, lævibus; pedunculis calycibusque glabris.

Ex Hispania. ☉ Cav. diff. 2.

Explicatio iconum.

Tab. 114. TRIGUERA ambrosiaca. (a) Corolla antice spectata. (b) Eadem à latere visa. (c) Stamina. (d) Urceolus staminum. (e) Stamen separatum, cum anthera intus visa. (f) Pistillum. (g) Fructus intra calycem. (h) Idem denudatus. (i) Idem sectus ut locula appareant. (l) Semen. (m) Idem decorticatum. Fig. ex D. Cavan. (n) Pars superior caulis, cum foliis & floribus. Ex Sicco.

322. * M A R K E A.

Charact. essent.

CAL. longus, 5-fidus. Cor. hypocrateriformis: limbo subæquali obtuso. Capf. teres, 2-locularis, polysperma.

Charact. nat.

Cal. monophyllus, longus, pentagono-prismaticus, ultra medium quinquefidus: laciniis lineari-lanceolatis, acutis, erectis.

Cor. monopetala, hypocrateriformis. Tubus cylindricus, calyce longior. Linibus patens, quinque-lobus, tubo brevior: lobis obtusis, planis, subæqualibus.

Stam. Filamenta quinque, æqualia, longitudine tubi. Anthæræ ad faucem.

Pist. Germen superum, oblongum, desinens in stylum brevem. Stigma.....

Peric. Capsula oblonga, teres, acutiuscula, bilocularis, calyce obvallata.

Sem. plurima, teretia.

Tableau des espèces.

2298. MARKÉE écarlate. Dict. suppl.

L. n. la Guiane. $\bar{\eta}$ *Pl. frutescente, sarmentueuse* : à feuilles alt. simples. Pédoncules terminaux. *Fl. écarlates, disp. en corymbes paniculés, pendans.*

323. J A B O R O S E.

Charact. essent.

CAL. court. *Cor.* tubuleuse, 5-fide. Filaments planes, attachés au sommet du tube. Stigmate en tête, mucroné.

Charact. nat.

Cal. monophylle, court, semi-quinquesfide : à découpures pointues.

Cor. monopétale, tubuleuse, quelquefois presque campanulée, beaucoup plus longue que le calice. Limbe quinquesfide : à découpures pointues.

Etam. Cinq filaments, courts, planes, attachés au sommet du tube. *Anth.* en cœur, droites.

Pist. Ovaire supérieur, arrondi. Style simple, de la longueur du tube. Stigmate en tête, mucroné.

Péric (3-locul. *Commerf.*)

Sem

Tableau des espèces.

2299. JABOROSE à f. entières. Dict. n°. 1.

J. à feuilles ovales, entières, obsc. dentées ; fleur longue, tubuleuse.

L. n. les env. de Buenos-Aires. *Commerf.*

2300. JABOROSE roncinée. Dict. n°. 2.

J. à feuilles sinuées-en lyre, dentées ; fleur courte, subcampanulée.

L. n. Monte-Video. *Commerf.*

Explication des fig.

Pl. 114. JABOROSE à feuilles entières. (a) Feuilles radicales. (b) Fleur entière. (c) Corolle ouverte. (d) Calice, pistil.

Conspectus specierum.

2298. MARKEA coccinea.

Ex Guiana. $\bar{\eta}$ *Rich. in. ad. soc. nat. paris. p. 107. Pl. frutescens, sarmentosa, glaberrima. Fol. alterna. ped. terminales, corymboso-paniculati, penduli.*

323. J A B O R O S A.

Charact. essent.

CAL. brevis. *Cor.* tubulosa, 5-fida. Filamenta plana, summo tubo inserta. Stigma capitatumucronatum.

Charact. nat.

Cal. monophyllus, brevis, semi-quinquesfidus : laciniis acutis.

Cor. monopetala, tubulosa, interdum subcampanulata, calyce multo longior. Limbus quinquesfidus : laciniis acutis.

Stam. Filamenta quinque, brevia, plana, summo tubo inserta. *Antheræ* cordatæ, erectæ.

Pist. Germen superum, subrotundum. Stylus simplex, longitudine tubi. Stigma capitatum, mucronatum.

Péric (3-locul? *Commerf.*)

Sem

Conspectus specierum.

2299. JABOROSA integrifolia. T. 114.

J. foliis ovatis, integris, subdentatis ; flore longo, tubuloso.

Ex Agro-Bonariensi. *Scapi 1-flori.*

2300. JABOROSA runcinata.

J. foliis sinuato-lyratis, dentatis ; flore brevi, subcampanulato.

E Monte-Vid. &c. *Scapi ut in pr. fol. taraxaci.*

Explicatio iconum.

Tab. 114. JABOROSA integrifolia. (a) Folia radicalia. (b) Flos integer. (c) Corolla aperta. (d) Calyx, pistillum.

324. BELLADONE.

Charact. essent.

Cor. campanulée, 5-fide. Etam. distantes. Baie 2-loculaire, posée sur le calice.

Charact. nat.

Cal. monophylle, persistant, quinquefide : à découpures pointues.

Cor. monopétale, campanulée. Tube court. Limbe un peu ventru, plus long que le calice, quinquefide : à découp. presque égales.

Etam. Cinq filamens, subulés, attachés à la base de la corolle, connivens dans leur partie inférieure, divergens en-dehors supérieurement, arqués. Anth. distantes, un peu épaisses.

Pist. Ovaire supérieur, ovale. Style filiforme, de la longueur des étamines, incliné. Stigmate en tête, divisé par un sillon.

Péric. Baie globuleuse, posée sur le calice, biloculaire. Placentas opposés, saillans, convexes, attachés à la cloison.

Sem. nombreuses, réniformes.

Tableau des espèces.

2301. BELLADONE *mandragore*. Dict. n° 1.
B. sans tige, à hampes uniflores.

L. n. l'Europe austr. aux lieux ombragés. π Baie pleine, 2-loculaire.

2302. BELLADONE *vulgaire*. Dict. n° 2.
B. à tige herbacée, droite; feuilles ovales; fleurs d'un pourpre brun.

L. n. la Fr., l'Italie, &c. π *Pl. dangereuse*.

2303. BELLADONE *couchée*. Dict. suppl.
B. à tige herbacée, couchée; feuilles ovales, glabres; corolles très-ouvertes.

L. n. le Pérou. \odot *Cor.* presque en roue, d'un blanc pâle & jaunâtre. *Fl.* en ombelle, axill.

2304. BELLADONE *arborescente*. Dict. n° 3.
B. à tige ligneuse, arborescente; feuilles ovales-oblongues, pointues; péd. ramassés.
L. n. l'Amér. mérid. π B. à feuilles de Nicotiane. Dict. n. 3. *Cestreau campan.* Dict. n. 6.

324. ATROPA.

Charact. essent.

Cor. campanulata, 5-fida, Stam. distantia. Bacca 2-locularis, calyci insidens.

Charact. nat.

Cal. monophyllus, persistens, quinquefidus : laciniis acutis.

Cor. monopetala, campanulata. Tubus brevis. Limbus subventricosus, calycelongior, quinquefidus : laciniis subæqualibus.

Stam. Filamenta quinque, subulata, è basi corollæ enata, infernè conniventia, supernè extrorsum divergentia, arcuata. Antheræ distantes, crassiusculæ.

Pist. Germen superum, ovatum. Stylus filiformis, longitudine staminum, inclinatus. Stigma capitatum, sulco divisum.

Peric. Bacca globosa, calyci insidens, bilocularis. Receptacula seminum opposita, prominula, convexa, septo affixa.

Sem. Plurima, reniformia.

Conspectus specierum.

2301. ATROPA *mandragora*.
A. acaulis, scapis unifloris. *L.*
Ex Europa austr. in umbrosis. π *Bacca solida*, 2-locularis. *Gærtn. t. 131.*

2302. ATROPA *belladonna*. T. 114. f. 1.
A. caule herbaceo, erecto; foliis ovatis; floribus purpureo-fuscis.
E Gallia, Italia, &c. π *Jacq. austr. 4. t. 309.*

2303. ATROPA *procumbens*.
A. caule herbaceo, procumbente; foliis ovatis, glabris; corollis patentissimis.
E Peru. \odot *A. procumbens*. *Cav. ic. p. 53. tab. 72. Fl. umbellati, axill.*

2304. ATROPA *arborescens*.
A. caule fruticoso, arborescente; foliis ovato-oblongis, acutis; pedunculis aggregatis.
Ex America merid. π *Burm. Amer. t. 46. f. 1. Corollæ albæ, laciniis revolutis.*

PENTANDRIE MONOGYNIE.

2305. BELLADONE *frutescente*. Dict. n°. 4.
B. à tige ligneuse, très-rameuse; feuilles en cœur-ovales, obtuses; pédoncules presque solitaires.

L. n. l'Espagne. $\bar{\eta}$ Cor. d'un verd jaunâtre.

Explication des fig.

Pl. 114. f. 1. BELLADONE *vulgaire*. (a) Fleur entière. (b) Corolle séparée. (c) Calice. (d, e) Étamines. (f, g) Pistil. (h) Baie. (i) La même coupée transversalement. (l) Semences.

Pl. 114. f. 2. BELLADONE *frutescente*.

325. MORELLE.

Charact. essent.

COR. en roue. Anth. souvent réunies, s'ouvr. au sommet par 2 trous. Baie 2-loculaire.

Charact. nat.

Cal. monophylle, semi-quinquéfide, droit, pointu, persistant.

Cor. monopétale, en roue. Tube très-court. Limbe grand, plane, ouvert, quelquefois réfléchi, quinquéfide.

Étam. Cinq filaments, subulés, très-petits, insérés à l'orifice du tube. Anthères oblongues, conniventes, presque réunies, s'ouvrant au sommet par 2 trous.

Pist. Ovaire supérieur, arrondi. Style filiforme, plus long que les étamines. Stigmate obtus.

Péric. Baie arrondie, quelquefois ovale, glabre, biloculaire. Récept. des semences convexe, charnu, adné à la cloison de chaque côté.

Sem. nombreuses, arrondies, comprimées, nichées dans une pulpe.

Tableau des espèces.

* Pl. sans piquans.

2306. MORELLE *feuilles de molène*. Dict.
M. à tige inermes, fruticuleuse; feuilles ovales, tomenteuses, très-entières; omb. composées.
L. n. l'Amérique. $\bar{\eta}$ Même port que la suiv.

PENTANDRIA MONOGYNIA. 13

2305. ATROPA *frutescens*. T. 114. f. 2.

A. caule fruticoso, ramosissimo; foliis cordato-ovatis, obtusis; pedunculis subsolitariis.

Ex Hispania. $\bar{\eta}$ Barrel. ic. 1173.

Explicatio iconum.

Tab. 114. f. 1. ATROPA *belladonna*. (a) Flos integer. (b) Corolla separata. (c) Calyx. (d, e) Stamina. (f, g) Pistillum. (h) Bacca. (i) Eadem transversè secta. (l) Semina. Fig. ex Mill.

Tab. 114. f. 2. ATROPA *frutescens*.

325. SOLANUM.

Charact. essent.

COR. rotata. Antheræ subcoalitæ, apice poro gemino dehiscentes. Bacca 2-locularis.

Charact. nat.

Cal. monophyllus, semi-quinquëfidus, erectus, acutus, persistens.

Cor. monopetala, rotata. Tubus brevissimus. Limbus magnus, planus, patens, subreflexus, quinquëfidus.

Stam. Filamenta quinque, subulata, minima, fauci tubi inserta. Antheræ oblongæ, conniventes, subcoalitæ, apice poris duobus dehiscentes.

Pist. Germen superum, subrotundum. Stylus filiformis, staminibus longior. Stigma obtusum.

Peric. Bacca subrotunda, interdum ovata, glabra, bilocularis. Receptac. sem. convexum, carnosum, septo utrinque adnatum.

Sem. plurima, subrotunda, compressa, nidulantia.

Conspectus specierum.

* Pl. inermes.

2306. SOLANUM *verbascifolium*.

S. caule inermi, fruticoso; foliis ovatis, tomentosis, integerrimis; umbellis compositis.

Ex America. $\bar{\eta}$ Jacq. Hort. 2. t. 13.

14 PENTANDRIE MONOGYNIE.

2307. MORELLE *auriculée*. Dict.
M. à tige inerme, fruticuleuse; feuilles ovales, très-entières, tomenteuses; stipulés en oreilles, entourant le rameau.
L. n. l'île de Bourbon. $\bar{\eta}$ *Grand arbrisseau tomenteux comme le précédent. cor. glabre.*

2308. MORELLE *feuilles de sauge*. Dict.
M. à tige inerme, fruticuleuse; feuilles ovales-lancéolées, tomenteuses en dessous; calices & corolles tomenteux.
L. n. la Guiane. $\bar{\eta}$ *F. entières; cime pédonc.*

2309. MORELLE *feuilles de laurier*. Dict.
M. à tige inerme, arborée; feuilles pétiolées, ovales-oblongues, tomenteuses en-dessous; panicule terminale, dichotome, divergente.
L. n. les bois de l'Amér. mérid. $\bar{\eta}$

2310. MORELLE *effilée*. Dict.
M. à tige inerme, frutescente; rameaux effilés; feuilles ovales-pointues; toment. en-dessous; ombelles fétilles.
L. n. les Canaries? $\bar{\eta}$ *Rameaux presque sarmenteux, sup. dichotomes. Fl. violettes.*

2311. MORELLE *faux-piment*. Dict.
M. à tige inerme, fruticuleuse; feuilles lancéolées, onduées, glabres; ombelles fétilles.
L. n. l'île de Madère. $\bar{\eta}$ *Vulg. le petit cérisier d'hiver, l'amome des jardiniers.*

2312. MORELLE *diphylle*. Dict.
M. à tige inerme, fruticuleuse; feuilles glabres, géminées, dont une plus petite; cimes courtes, latérales.
L. n. l'Amérique. $\bar{\eta}$ *F. ovales-lancéolées, un peu obtusés.*

2313. MORELLE *sombre*. Dict.
M. à tige inerme, frutescente; feuilles lancéolées-ovales, presque onduées, glabres; cimes courtes, latérales.
L. n. la Martinique. $\bar{\eta}$ *La Barrère.*

2314. MORELLE *à grappes*. Dict.
M. à tige inerme, frutescente; feuilles lancéolées, onduées, presque sinuées; grappes droites; alongées.
L. n. la Martinique,

PENTANDRIA MONOGYNIA

2307. SOLANUM *auriculatum*.
S. caule inermi, fruticoso: foliis ovatis, integerrimis, tomentosis; stipulis auriculatis, ramulum cingentibus.
Ex insula Mauritiana. $\bar{\eta}$ *S. Mauritianum. Scop. delic. inf. 3. t. 8. Absque stipulis.*

2308. SOLANUM *salvifolium*.
S. caule inermi, fruticoso; foliis ovato-lanceolatis, subtus tomentosis; calycibus corollisque tomentosis.
Ex Guiana. $\bar{\eta}$ *An f. subinermi. Jacq.*

2309. SOLANUM *laurifolium*.
S. caule inermi, arboreo; foliis petiolatis, ovato-oblongis, subtus tomentosis; panicula terminali, dichotoma divaricata.
Ex Americæ australis sylvis. $\bar{\eta}$ *L. f. suppl.*

2310. SOLANUM *virgatum*.
S. caule inermi, frutescente; ramis virgatis; foliis ovato-acutis, subtus tomentosis; umbellis sessilibus.
E Canariis? $\bar{\eta}$ *Rami subsarmentosi, superne dichotomi. Fl. violacei.*

2311. SOLANUM *pseudo-capsicum*.
S. caule inermi, fruticoso; foliis lanceolatis, repandis, glabris; umbellis sessilibus.
Ex Madera. $\bar{\eta}$ *Baccæ hyeme ruberrimi, cerasiformes. Fl. albi, minimi.*

2312. SOLANUM *diphyllum*.
S. caule inermi, fruticoso; foliis glabris, geminis, altero minore, cymis brevibus, lateralibus.
Ex America. $\bar{\eta}$ *Jacq. collect. 2. p. 331. Ic. rar. vol. 2.*

2313. SOLANUM *triste*.
S. caule inermi, frutescente; foliis lanceolato-ovatis, subrepandis, glabris; cymis brevibus, lateralibus.
E Martinica. $\bar{\eta}$ *Jacq. Amér. 50. t. 40. f. 2.*

2314. SOLANUM *racemosum*.
S. caule inermi, frutescente; foliis lanceolatis, repandis undulatis; racemis longis, rectis.
Ex Martinica. $\bar{\eta}$ *Jacq. Amer. t. 36.*

2315. MORELLE de la Havane. Diâ.

M. à tige inerme, frutescente : feuilles oblongues-lancéolées, entières, luisantes ; grappes pauciflores.

L. n. la Martinique, &c. \bar{h} F. un peu obtuses ; fl. bleues, grandes.

2316. MORELLE nodiflore. Diâ.

M. à tige inerme, foible, frutescente : feuilles ovales, entières, glabres : rameaux dichotomes, épaissis aux nœuds.

L. n. l'île de France. \bar{h} Ombelles lat. pédonculées ; fl. petites, blanchâtres.

2317. MORELLE à étoile. Diâ.

M. à tige inerme, foible, frutescente : feuilles entières : péd. subgeminés : fl. plane, stellifère.

L. n. \bar{h} F. glabres, ovales-lancéolées, acum.

2318. MORELLE fugace. Diâ.

M. à tige inerme, fruticuleuse : rameaux dichotomes, très-divergens : péd. solitaires : fleur plane, stellifère.

L. n. l'Amér. mérid. \bar{h} Fl. très-fugaces ; cor. blanche, à étoilé jaunâtre.

2319. MORELLE lycioïde. Diâ.

M. à tige inerme, fruticuleuse : rameaux très-nombreux, spinescens : fleur plane, stellifère.

L. n. l'Amér. mérid. ? \bar{h} F. petites. Fl. blanches. Baies rouges, petites ; à sem. offeuses.

2320. MORELLE ramassée. Diâ.

M. à tige inerme, fruticuleuse ; feuilles ovales, obtuses ; pédoncules simples.

L. n. la Guinée. \bar{h} Les anth. sont un peu séparées, comme dans beaucoup d'autres esp. de ce genre ; mais elles sont perforées au sommet. Cor. violette.

2321. MORELLE terminale. Diâ.

M. inerme, frutescente ; feuilles lancéolées, ovales, presque très-entières, pileuses ; ombelles terminales.

L. n. l'Arabie. \bar{h} Tiges couchées, ram. vers leur sommet. Cor. blanche.

2315. SOLANUM Havanense.

S. caule inermi, frutescente ; foliis oblongo-lanceolatis, integris, nitidis ; racemis paucifloris.

Ex Martinica, &c. \bar{h} Jacq. Amer. t. 35. Swartz. obs. p. 82.

2316. SOLANUM nodiflorum.

S. caule inermi, debili, frutescente ; foliis ovatis, integris, glabris : ramis dichotomis, ad nodos incrassatis.

Ex insula Mauritii. \bar{h} Jacq. collect. 2. p. 288 & Ic. rar. vol. 2.

2317. SOLANUM stellatum.

S. caule inermi, debili, frutescente ; foliis integris ; pedunculis subgeminis ; flore plano, stellifero.

Ex . . . \bar{h} Jacq. collect. 3. p. 254. Ic. rar. v. 2.

2318. SOLANUM fugax.

S. caule inermi, fruticoso ; ramis dichotomis, divaricatissimis ; pedunculis solitariis ; flore plano, stellifero.

Ex Amer. merid. \bar{h} Jacq. collect. 4. p. 123. & Ic. rar. vol. 2.

2319. SOLANUM lycioides.

S. caule inermi, fruticoso ; ramis spinescens, numerosissimis ; flore plano, stellifero.

Ex Amer. merid. ? \bar{h} Affin. præcedenti. Baccæ rubræ, parvæ ; sem. offeis.

2320. SOLANUM aggregatum.

S. caule inermi, fruticoso ; foliis ovatis, obtusis, aggregatis ; pedunculis simplicibus.

Ex Guinea. \bar{h} Atropa solanacea. Lin. Vogel. Ic. rar. t. 16. S. Aggregatum. Jacq. collect. 4. p. 124. & Ic. rar. v. 2. fol. nimis parva.

2321. SOLANUM terminale.

S. inerme, frutescens : foliis lanceolato-ovatis, subintegerrimis, pilosis ; umbellis terminalibus.

Ex Arabia. \bar{h} S. terminale. Forsk. Egypt. 45. Wahl. symb. 2. p. 40.

2322. MORELLE *douce-amère*. Dict.
M. à tige inerme, frutescente, flexueuse ;
feuilles supérieures, hastées ; grappes en cime.
L. n. l'Europe, dans les haies. \bar{h} Cor. violette,
Baies rouges.
2323. MORELLE à *feuilles épaisses*. Dict.
M. inerme, frutescente, velue, subsarment-
teuse ; feuilles ovales, entières ou sinuées-
anguleuses, un peu obtuses ; fleurs pendantes.
L. n. l'Afrique. \bar{h} Fl. plus grandes que dans
la précédente.
2324. MORELLE *tégorée*. Dict.
M. inerme, velue, frutescente ; feuilles in-
férieures, très-grandes, sinuées-pinnatifides ;
les supérieures en cœur.
L. n. la Guiane. \bar{h} Baies jaunâtres.
2325. MORELLE à *gros fruits*. Dict.
M. à tige inerme, suffrutescente ; feuilles
ovales-cunéiformes, onnées, presque sinuées,
glabres.
L. n. le Pérou. \bar{h} Tige basse. Fl. gr. bleues.
2326. MORELLE de *Quito*. Dict.
M. inerme, suffrutescente ; à feuilles pres-
qu'en cœur, à dents anguleuses, tomenteuses
des deux côtés ; pétioles & nervures pourprés.
L. n. l'Amér. méridionale. \bar{h} Baie jaune,
très-grosse.
2327. MORELLE de *montagne*. Dict.
M. à tige inerme, herbacée ; feuilles pres-
qu'en cœur, onnées.
L. n. le Pérou. \bar{h} Rac. tubéreuse. Tige basse.
2328. MORELLE *tubéreuse*. Dict.
M. à tige inerme, herbacée ; feuilles pinnées,
à folioles entières ; cime pédonculée.
L. n. le Pérou, le Brésil. \odot Rac. tub. bonne
à manger, Vulg. la pomme de terre.
2329. MORELLE *feuilles de pimprenelle*. Dict.
M. tige inerme, herbacée ; feuilles pinnées,
à folioles entières ; grappes simples.
L. n. le Pérou.
2322. SOLANUM *dulcamara*.
S. caule inermi, frutescente, flexuoso ; fo-
liis superioribus, hastatis ; racemis cymosis.
Ex Europæ sepibus. \bar{h} Cor. violacea. Bacca
rubra.
2323. SOLANUM *crassifolium*.
S. inerme, frutescens, hirsutum, subsarment-
tosum ; foliis ovatis, integris, vel sinuato-
angulosis, obtusiusculis ; floribus pendulis.
Ex Africa. \bar{h} Dill. Elth. t. 273. Cor. pur-
puro-violacea.
2324. SOLANUM *tegore*.
S. inerme, villosum, frutescens ; foliis in-
ferioribus, amplissimis, sinuato-pinnatifidis ;
superioribus cordatis.
Ex Guiana. \bar{h} Aubl. Guian. t. 84.
2325. SOLANUM *macrocarpon*.
S. caule inerme, suffruticoso ; foliis ovato-
cuneatis, repandis, subsinuatis, glabris.
E Peru. \bar{h} Mill. Ic. 196. t. 294.
2326. SOLANUM *quitoense*.
S. inerme, suffrutescens ; foliis subcordatis,
dentato-angulatis, utrinque tomentosis : pe-
tiolis nervisque purpurascens.
Ex Amer, merid. \bar{h} Feuill. obs. 3. p. 61. t. 46.
2327. SOLANUM *montanum*.
S. caule inermi, herbaceo ; foliis subcordatis,
repandis.
E Peru. \bar{h} S. tuberosum minus. Feuill. obs.
3. t. 46.
2328. SOLANUM *tuberosum*.
S. caule inermi, herbaceo ; foliis pinnatis,
integerrimis ; cyma pedunculata.
E Peru, Brasilio. \odot Rad. tuberosa, esculenta,
luxurians.
2329. SOLANUM *pimpinellifolium*.
S. caule inermi, herbaceo ; foliis pinnatis,
integerrimis ; racemis simplicibus.
E Peru. Lin. Amæn. acad. 4. p. 268.

PENTANDRIE MONOGYNIE.

2330. MORELLE *pomme-d'amour*. Dict.
M. à tige inerme, herbacée; feuilles pinnées, incisées; fleurs septemfides; fruit toruleux.
L. n. l'Amér. méridionale. ☉ La Tomate.
Baie rouge, grosse, déprimée.
2331. MORELLE *du Pérou*. Dict.
M. inerme, suffrutescente; feuilles pinnées, tomenteuses: stipules & bractées arrondies; baies un peu pileuses.
L. n. le Pérou. ☿ *Folioles un peu obtuses. Fl. jaunes, quinquesfides.*
2332. MORELLE *multifide*. Dict.
M. à tige inerme, subherbacée, ailée; feuilles laciniées-multifides, lisses, decurrentes; à découpures obtuses.
L. n. le Pérou. ☿ ou ☿ *Tige droite. Fl. planes, d'un violet pâle, en grappe paniculée.*
2333. MORELLE *pinnatifide*. Dict.
M. à tige herbacée, droite, lisse; feuilles grandes, profondément pinnatifides, très-glabres; fleur plane.
L. n. le Pérou. ☿ *Fl. bleuâtres; anth. disjointes.*
2334. MORELLE *feuilles de chêne*. Dict.
M. à tige inerme, subherbacée, anguleuse, flexueuse, scabre; feuilles pinnatifides; grappes en cime.
L. n. le Pérou. ☿ *Fl. violettes.*
2335. MORELLE *radicante*. Dict.
M. à tige inerme, herbacée, lisse, presque cylindrique, couchée, radicante; feuilles pinnatifides; grappes en cime.
L. n. le Pérou. ☿ *Fl. petites, d'un violet pâle.*
2336. MORELLE *à corymbes*. Dict.
M. à tige inerme, presque herbacée; feuilles ovales-pointues, entières, glabres; fl. presque en corymbe.
L. n. le Pérou. ☿ *Pétiolés decurrens sur la tige. Fl. petites, violettes.*
2337. MORELLE *noire*. Dict.
M. à tige inerme, herbacée; feuilles ovales,
Botanique. Tome II.

PENTANDRIA MONOGYNIA. 17

2330. SOLANUM *lycopersicum*. T. 115. f. 2.
S. caule inermi, herbaceo; foliis pinnatis, incisis; floribus septemfidis; fructu toruloso.
Ex Amer. merid. ☉ *Fl. lutei. Bacca rubra, depressa, magna.*
2331. SOLANUM *Peruvianum*.
S. inerme, suffrutescens; foliis pinnatis, tomentosis: stipulis bracteisque subrotundis; baccis subpilosis.
E Peru. ☿ *Lycopers. Feuill. obs. 3. t. 25. Jacq. collect. 2. p. 284. Ic. rar. vol. 2.*
2332. SOLANUM *multifidum*. T. 115. f. 3.
S. caule inermi, subherbaceo, alato; foliis laciniato-multifidis, lævibus, decurrentibus; laciniis obtusis.
E Peru. ☿ f. ☿ *An f. foliis quernis. Feuill. obs. 2. t. 15. At fol. non satis laciniata.*
2333. SOLANUM *pinnatifidum*. T. 115. f. 4.
S. caule herbaceo, erecto, lævi; foliis amplis, profundè pinnatifidis, glaberrimis; flore plano.
E Peru. ☿ *Fl. cærulescentes. Antheræ distinctæ.*
2334. SOLANUM *quercifolium*.
S. caule inermi, subherbaceo, angulato, flexoso, scabro; foliis pinnatifidis; racemis cymosis.
E Peru. ☿ *Fl. violacei.*
2335. SOLANUM *radicans*.
S. caule inermi, herbaceo, lævi, teretiusculo prostrato, radicante; foliis pinnatifidis; racemis cymosis..
E Peru. ☿ *Lin. f. decad. t. 10.*
2336. SOLANUM *corymbosum*.
S. caule inermi, subherbaceo; foliis ovato-acuteis, integris, glabris; floribus subcorymbosis.
E Peru. ☿ *Jacq. collect. 2. p. 78. Ic. rar. v. 1. Retz. obs. 3. p. 22. n. 53.*
2337. SOLANUM *nigrum*.
S. caule inermi, herbaceo; foliis ovatis,
C

18 PENTANDRIE MONOGYNIE.

à dents anguleuses ; ombelles simples, penchées ; fruit noir.

L. n. l'Europe , aux lieux cultivés. ☉ *Feuilles vertes , presque glabres ; fl. blanches.*

2338. MORELLE *velue*. Diâ.

M. à tige inerme , herbacée ; feuilles ovales , velues ; dents anguleuses ; ombelles simples ; fruit jaune.

L. n. la France australe , &c. ☉

2339. MORELLE *de Guinée*. Diâ.

M. à tige inerme , herbacée , muriquée sur les angles ; feuilles larges-ovales , entières , glabres ; fruit noir.

L. n. la Guinée. ☉ *Fr. plus gros que celui de la M. noire.*

2340. MORELLE *anserine*. Diâ.

M. à tige inerme , subherbacée ; feuilles ovales-oblongues , sinuées ; un peu velues : les plus jeunes tomentueuses en-dessous.

L. n. l'Île de France. *Ombelles lat. simples , pauciflores. fl. blanches.*

2341. MORELLE *d'Ethiopie*. Diâ.

M. à tige inerme , herbacée ; feuilles ovales , onduées-anguleuses , nues : fruit toruleux.

L. n. l'Ethiopie ; la Chine. ☉ *Fruit rouge , gros , déprimé.*

2342. MORELLE *triangulaire*. Diâ.

M. à tige inerme , herbacée , trigone ; feuilles oblongues , ovales , très-entières , nues ; cor. d'un violet pâle.

L. n. les Indes orient. ☉ *Fl. petites. Feuilles décurrentes sur leur pétiole.*

β. *La même ? à tige tétragone , scabre. Du Cap de Bonne Espérance.*

2343. MORELLE *feuilles étroites*. Diâ.

M. inerme , subherbacée , à feuilles étroites-lanceolées , un peu obtusés , nues ; corymbe terminal.

L. n. les environs de Buenos-Ayres.

2344. MORELLE *scabre*. Diâ.

M. inerme , subherbacée , à tige scabre par

PENTANDRIA MONOGYNIA.

dentato-angulatis ; umbellis simplicibus , nuntantibus ; fructu nigro.

Ex Europæ cultis. ☉ *Fol. virid. nudiuscula. Flores albi.*

2338. SOLANUM *villosum*.

S. caule inermi , herbaceo ; foliis ovatis , hirsutis , dentato-angulatis ; umbellis simplicibus ; fructu luteo.

Ex Gallia australi , &c. ☉

2339. SOLANUM *Guineense*.

S. caule inermi , herbaceo , ad angulos muricato ; foliis lato-ovatis , integris , glabris ; fructu nigro.

Ex Guinea. ☉ *Dill. Elth. t. 274. f. 354.*

2340. SOLANUM *chenopodioides*.

S. caule inermi , subherbaceo ; foliis ovato-oblongis , repando-sinuatis , su* hirsutis : junioribus subtus tomentosis.

Ex inf. Mauritiana. *An f. chenopodioides. Feuill. obs. 2. t. 14.*

2341. SOLANUM *Æthiopicum*.

S. caule inermi , herbaceo ; foliis ovatis , repando-angulatis , nudis ; fructu toruloso.

Ex Æthiopia , China. ☉ *Fr. ruber ; magnus , depressus.*

2342. SOLANUM *triangulare*.

S. caule inermi , herbaceo , trigono ; foliis oblongo-ovatis , integerrimis , nudis ; corollis pallide violaceis.

Ex Indiis orient. ☉ ? *Halicac. baccif. Rumph. amb. 6. t. 26. f. 2.*

β. *Idem ? caule tetragono , scabro. S. quadrangulare. Suppl. 147.*

2343. SOLANUM *angustifolium*.

S. inerme , subherbaceum ; foliis angustolanceolatis , obtusiusculis , nudis ; corymbo terminali.

Ex Agro-Banariensi. *Commerç.*

2344. SOLANUM *scabrum*.

S. inerme , subherbaceum ; caule tuberculis

PENTANDRIE MONOGYNIE.

des tubercules , rampante à la base ; feuilles oblongues , lancéolées , pubescentes.

L. n. le Pérou. *¶ Melongene du Pérou. Fruit ovale.*

β. Elle varie à f. appendiculées, presque pinnées.

2345. MORELLE feuilles de poirier. Dict.

M. inerme , herbacée ; à feuilles ovales , entières , nues de chaque côté ; panicule terminale ; cal. obtus.

L. n. la Martinique. *Jof. Martin.*

2346. MORELLE grimpante. Dict.

M. inerme , à tige volubile ; feuilles en cœur , ovales , pendantes , très-molles en-dessous ; panicules terminales.

L. n. Surinam. *Tige herbacée.*

2347. MORELLE en lyre. Dict.

M. inerme , herbacée , droite ; à feuilles en lyre , hastées , tomenteuses.

L. n. le Japon. *Pl. tomenteuse ; mais à calices & pédoncules propres , glabres.*

* *MORELLE (aviculaire) à tige inerme , fruticuleuse ; feuilles sinuées-pinnatifides ; corymbes terminaux. De la Nouvelle-Zélande.*

* *MORELLE (laciniée.) à tige suffruticuleuse , inerme , très-glabre ; feuilles pinnatifides : à déc. lancéolées , pointues ; panicules axill. gémées ou ternées. De la Nouv. Zélande.*

** *Pl. munies de piquans.*

2348. MORELLE melongène. Dict.

M. à tige inerme , herbacée ; feuilles ovales , sinuées , tomenteuses ; calices à piquans rares ; fruit oblong.

L. n. les Indes. *⊙ L'aubergine.*

β. La même à fruit ovale , blanc. La melongène ovifère.

2349. MORELLE felle. Dict.

M. à tige herbacée , garnie de piquans : feuilles ovales , un peu sinuées , tomenteuses ; cal. à piquans : fruit oblong.

L. n. l'Inde. *⊙ Elle semble n'être qu'une variété de la précédente.*

PENTANDRIA MONOGYNIA. 19

scabro , basi repente ; foliis oblongo-lanceolatis , pubescentibus.

E Peru. ¶ Melongena , &c. Feuillée. obs. 2. tab. 26.

β. Variat foliis appendiculatis , subpinnatis.

2345. SOLANUM pyrifolium.

S. inerme , herbaceum ; foliis ovatis , integris , utrinque nudis ; panicula terminali ; calycibus obtusis.

E Martinica, Flores f. quercifolii. , majusculi.

2346. SOLANUM scandens.

S. inerme , caule volubili ; foliis cordatis , ovatis , dependentibus , subtus mollissimis ; paniculis terminalibus.

E Surinamo. Lin. f. suppl. 147.

2347. SOLANUM lyratum.

S. inerme , herbaceum , erectum ; foliis lyrato-hastatis , tomentosis.

Ex Japonia. Thunb. Fl. Jap. 92. Pl. tomentosa ; at pedicelli calycisque glabri.

* *SOLANUM (aviculare) caule inermi , fruticoso ; foliis sinuato-pinnatifidis : corymbis terminalibus. Forst. Fl. austr. n°. 107.*

* *SOLANUM (laciniatum) caule suffruticoso , inermi , glaberrimo ; foliis pinnatifidis : laciniis lanceolatis , acutis ; paniculis axillaribus , blais ternisve. Hort. Kew. p. 247.*

** *Pl. aculeatæ.*

2348. SOLANUM melongena.

S. caule inermi , herbaceo ; foliis ovatis , sinuatis , tomentosis ; calycibus rariter aculeatis ; fructu oblongo.

Ex Indiis. ⊙ Fruct. subviolaceus , edulis.

β. Idem fructu ovato , alb. Melongena ovigera. Ex hort. Paris.

2349. SOLANUM insanum.

S. caule aculeato , herbaceo ; foliis ovatis , subsinuatis , tomentosis ; calycibus aculeatis ; fructu oblongo.

Ex India. ⊙ Moris. sec. 23. t. 2. f. 2. Pluk. t. 226. f. 3. Rheed. mal. 10. t. 74.

2350. MORELLE de Ceylan. Diâ.

M. à tige garnie de piquans, fruticuleuse ; feuilles ovales, sinuées, subtomenteuſes : cal. à piquans : fruit oviforme.

L. n. l'ifle de Ceylan. Elle a des rapports avec la précéd. ; mais elle en eſt diſt. ſi elle eſt frutiq.

2351. MORELLE féroce. Diâ.

M. à tige garnie de piquans, herbacée ; feuilles en cœur, anguleuſes, tomenteuſes, à piquans : baies hériffées, recouvertes par le calice.

L. n. le Malabar.

2352. MORELLE brune. Diâ.

M. à tige garnie de piquans, duré, preſque brune : feuilles ovales, ſinuées-lobées ; piquans d'un pourpre brun : fruit globuleux.

L. n. l'Amérique. ☉ *Fl. grandes, violettes.*

♢. La même à tige & piquans moins colorés ; cal. verds.

2353. MORELLE de Campêche. Diâ.

M. à tige garnie de piquans, hériffée : feuilles en cœur, oblongues, à cinq lobes : ſinus obtus, élevés.

L. n. l'Amérique. ☉

2354. MORELLE mammiforme. Diâ.

M. à tige herbacée, garnie de piquans ; feuilles en cœur, anguleuſes-lobées, velues des deux côtés, à piquans.

L. n. les iſles de l'Amérique. ☉ *Fruit jaune, en poire renverſée. La pomme teton.*

2355. MORELLE paniculée. Diâ.

M. à tige & petioles garnis de piquans : feuilles ſinuées-anguleuſes, glabres en-deſſus : fleurs paniculées.

L. n. le Bréſil. *F. tomenteuſes en-deſſous ; cal. incrimés.*

2356. MORELLE chevelue. Diâ.

M. fruticuleuse à piquans ; feuilles ovales, ſinuées, anguleuſes, tomenteuſes ; pétioles pédoncules, & calices très-échinées, preſque chevelus.

L. n. l'ifle de Cayenne. ☿ *Le blond. Les piquans des calices, des pédoncules, &c. ſétacés, mous, très-nombreux.*

2350. SOLANUM zeylanicum.

S. caule aculeato, fruticoſo : foliis ovatis, ſinuatis, ſubtomentofis ; calycibus aculeatis : fructu oviforme.

Ex Zeylona. *Scopol. delic. inſubr. 1. t. 1. bacca flava.*

2351. SOLANUM ferox.

S. caule aculeato, herbaceo : foliis cordatis, angulatis, tomentofis, aculeatis ; baccis hirtis, calyce obtectis. *Lin.*

Ex Malabaria. *Statura S. melongena.*

2352. SOLANUM fuscum.

S. caule aculeato, duro, ſubfulco : foliis ovatis, ſinuato-lobatis ; aculeis purpureo-fulcis : fructu globoſo.

Ex America ? ☉ *Cal. tomentofis ; cor. violacea.*

♢. *Idem caule aculeisſque minus coloratis. S. fuscum Jacq. collect. 1. p. 51. & ic. rar. 1.*

2353. SOLANUM campechiense.

S. caule aculeato, hirtio : foliis cordato-oblongis, quinquelobis : ſinibus obtuſis, elevatis.

Ex America. ☉ *Dill. Elth. t. 268. f. 347.*

2354. SOLANUM mammosum.

S. caule aculeato, herbaceo : foliis cordatis, angulato-lobatis, utrinque villoſis, aculeatis.

Ex inſulis americanis. ☉ *Fructus luteus, pyriformi forma. Pluk. t. 226. f. 1.*

2355. SOLANUM paniculatum.

S. caule petiolifque aculeatis : foliis ſinuato-angulatis, ſupra glabris : floribus paniculatis.

E Braſilia. *Pis. bras. 181. fig. ext. cal. inermes.*

2356. SOLANUM crinitum.

S. fruticoſum aculeatum ; foliis ovatis, ſinuato-angulatis, tomentofis ; petiolis pedunculis calicibuſque echinatifſimis, ſubcrinitis.

Ex Cayenna. ☿ *Fol. ampla, ſupra inermia, ſubtus rariter aculeata ; fl. maximi.*

2357. MORELLE de Virginie. Dict.

M. à tige anguleuse à piquans ; feuilles pinnatifides , à piquans de tous côtés ; ayant des découp. sinuées , obtuses ; calices à piquans.
L. n. l'Amérique. ☉ *Je l'ai de l'isle de France.*
Fl. violettes , fr. sphériques , petits , panachés de vert & de blanc , avant leur maturité.

2358. MORELLE sodomée. Dict.

M. à tige fruticuleuse , cylindr. à piquans ; feuilles pinnatifides , sinuées , d'un vert foncé , à piquans de toute part ; calice à piquans.
L. n. l'Afrique. ☿ *F. presque glabres , fl. violettes.*

2359. MORELLE de Caroline. Dict.

M. à tige annuelle , à piquans ; feuilles ovales-oblongues , sinuées , pinnatifides , subhastées , à piquans de chaque côté ; grappes lâches.
L. n. la Caroline. ☿ *Tige dure , presque suffruticuleuse.*

2360. MORELLE ciliée.

M. à tige herbacée , à piquans ; feuilles en cœur , sinuées , anguleuses , ciliées , à piquans ; pédoncules courts , pauciflores.
L. n. ☿ *F. d'un vert noirâtre.*

2361. MORELLE hérifsonne. Dict.

M. à tige suffruticuleuse très-piquante ; feuilles en cœur , lobées , anguleuses , velues , à piquans de chaque côté.
L. n. ☿ *Fl. blanches ; anthères séparées ; pédonc. courts , latéraux.*

2362. MORELLE hériflée. Dict.

M. fruticuleuse , à piquans ; feuilles en cœur , anguleuses , tomenteuses , à piquans ; péd. latéraux , ramifiés & très-velus , ainsi que les calices.
L. n. l'Isle de la Trinité. ☿

2363. MORELLE coagulante. Dict.

M. à tige fruticuleuse , à piquans ; feuilles oblongues , ondées , sinuées , tomenteuses , à piquans : lobes arrondis , entiers.
L. n. l'Arabie. ☿ *Feuilles obtuses , longues de 2 pouces. Ses baies servent à coaguler le lait.*

2364. MORELLE pyracanthe. Dict.

M. à tige suffruticuleuse , à piquans ; feuilles

2357. SOLANUM virginianum.

S. caule aculeato angulato ; foliis pinnatifidis undique aculeatis ; laciniis sinuatis obtusis , calycibus aculeatis.

Ex America. ☉ *Jacq. collect. 2 p. 285. & ic. rar. vol. 2. folia viridia , venis albis variegata ; spinae niveae , rectae.*

2358. SOLANUM sodomium. t. 125. f. 1.

S. caule aculeato , fruticoso , tereti ; foliis pinnatifido sinuatis , undique aculeatis , intensè viridibus ; calycibus aculeatis.

Ex Africa. ☿ *Herm. lugdb. t. 575.*

2359. SOLANUM carolinense.

S. caule aculeato annuo ; foliis ovato oblongis , sinuato pinnatifidis , subhastatis utrinque aculeatis ; racemis laxis.

Ex Carolina. ☿ *Jacq. collect. 2. p. 187. & ic. rar. vol. 2.*

2360. SOLANUM ciliatum.

S. caule aculeato herbaceo ; foliis cordatis , sinuato-angulatis , aculeatis , ciliatis ; pedunculis brevibus , paucifloris.

Ex ☿ *S. capsicoides , hort. Paris.*

2361. SOLANUM aculeatissimum.

S. caule suffruticoso aculeatissimo ; foliis cordatis , lobato-angulatis , hirsutis , utrinque aculeatis.

Ex ☿ *Jacq. collect. 1. p. 100. & ic. rar. vol. 1.*

2362. SOLANUM hirtum.

S. fruticosum , aculeatum ; foliis cordato-angulatis , tomentosis , aculeatis ; pedunc. lateralibus , aggregatis , calycibusque hirsutifimis.

Ex insl. Trinitatis. ☿ *Vahl. symbol. 2. p. 40.*

2363. SOLANUM coagulans.

S. caule aculeato fruticoso ; foliis oblongis , repando-sinuatis , tomentosis , aculeatis : lobis rotundatis , integris.

Ex Arabia. ☿ *Forsk. ægypt. p. 47. vahl. symb. 2. p. 41. pl. tomentoso-incana.*

2364. SOLANUM pyracanthos.

S. caule aculeato , suffruticoso ; foliis oblon-

22 PENTANDRIE MONOGYNIE.

oblongues, pointues, sinuées-pinnatifides, tomenteuses : piquans droits, presqu'écarlattes.

L. n. Madagascar. $\bar{\eta}$ *F. longues de 7 pouces ou davantage, à piquans de chaque côté.*

2365. MORELLE *stramoine*. Diâ.

M. fruticuleuse, à piquans ; à feuilles amples, presqu'en cœur, sinuées-anguleuses ; à piquans rares, un peu tomenteuses en-dessous.

L. n. les Indes orientales. $\bar{\eta}$ *S. acanthifolium. hort. Paris. cal. inermes.*

2366. MORELLE *d'Inde*. Diâ.

M. fruticuleuse, à piquans ; feuilles ovales, sinuées-anguleuses, tomenteuses en-dessous : à piquans droits de chaque côté.

L. n. l'Inde, l'Île de France. $\bar{\eta}$ *F. blanches en-dessous ; épines glabres ; fr. petits, écarlattes.*

2367. MORELLE *ondée*. Diâ.

M. fruticuleuse, à piquans ; feuilles ovales, on-dées, un peu toment. en-dessous : à piquans nuds.

L. n. l'Inde, l'Île de France. $\bar{\eta}$ *Jos. Martin. fr. gros, orangés.*

2368. MORELLE *hétérophylle*. Diâ.

M. fruticuleuse, à piquans ; feuilles ovales, sinuées-ondées, un peu toment. en-dessous : les autres plus petites ovoïdes très-entières,

L. n. la Guiane. $\bar{\eta}$ *Leblond.*

2369. MORELLE *de Palestine*. Diâ.

M. à tige fruticuleuse, à piquans ; feuilles obliquement ovales, on-dées & tomenteuses, ainsi que les piquans.

L. n. la Palestine, l'Arabie. $\bar{\eta}$

2370. MORELLE *marginée*. Diâ.

M. fruticuleuse, à piquans ; feuilles presqu'en cœur, sinuées, on-dées, blanches & toment. en-dessous : à bord blanc.

L. n. l'Abyssinie. $\bar{\eta}$ *Très-belle espèce, tomenteuse & fort blanche sur la plupart de ses parties.*

2371. MORELLE *tomenteuse*. Diâ.

M. fruticuleuse, à piquans ; feuilles en cœur, on-dées, tomenteuses, inermes ; les plus jeunes ayant un duvet pourpré.

L. n. l'Afrique. $\bar{\eta}$ *ram. à piquans très-fins.*

PENTANDRIA MONOGYNIA.

gis, acutis, sinuato-pinnatifidis, tomentosis : aculeis rectis, subcoccineis.

Ex Madagascaria. $\bar{\eta}$ *Joseph. Martin. Folia spithamea vel longiora, utrinque aculeata.*

2365. SOLANUM *stramonifolium*.

S. aculeatum, fruticosum ; foliis amplis, subcordatis, sinuato-angulatis, rariter aculeatis, subtus tomentosis.

Ex India orient $\bar{\eta}$ *Jacq. miscell. 2. p. 298. & ic. rar. vol 1. pl. 6-pedalis.*

2366. SOLANUM *indicum*.

S. fruticosum, aculeatum ; foliis ovatis, sinuato-angulatis, subtus tomentosis : aculeis utrinque rectis.

Ex India, Insula Franciæ. $\bar{\eta}$ *Burm. zeyl. t. 102. Rheed. mal. 2. t. 38. excluso dill. syn.*

2367. SOLANUM *undatum*.

S. fruticosum, aculeatum ; foliis ovatis, repandis, subtus tomentosis : aculeis nudis.

Ex India, Insula Franciæ. $\bar{\eta}$ *Rheed. mal. 2. t. 37.*

2368. SOLANUM *heterophyllum*.

S. fruticosum, aculeatum ; foliis ovatis, sinuato-repandis, subtus tomentosis : aliis minoribus obovatis integerrimis.

Ex Guiana. $\bar{\eta}$ *Aculei ramorum recurvi.*

2369. SOLANUM *sanctum*.

S. caule aculeato, fruticoso ; aculeis tomentosis, folisque oblique ovatis, repandis.

Ex Palæstina, Arabia, $\bar{\eta}$ *S. incanum. Forsk.*

2370. SOLANUM *marginatum*.

S. fruticosum, aculeatum ; foliis subcordatis, sinuato-repandis, subtus incano-tomentosis ; margine albo.

Ex Abyssinia. $\bar{\eta}$ *D. Bruce. Jacq. collect. 1. p. 50. & ic. rar. fl. albidis, bacca flavescentes.*

2371. SOLANUM *tomentosum*.

S. fruticosum, aculeatum ; foliis cordatis, repandis, tomentosis, inermibus : tenellis purpureo pulverulentis.

Ex Africa. $\bar{\eta}$ *Bocc. sic. 8. t. 5.*

PENTANDRIE MONOGYNIE.

PENTANDRIA MONOGYNIA. 23

2372. MORELLE à fruits rouges. Dict.

M. fruticuleuse, à piquans; feuilles presque en cœur, onnées, toment., à piquans rares: baies écarlates.

L. n..... *h* Ce n'est peut-être qu'une var. de la précédente.

2373. MORELLE roide. Dict.

M. à piquans, fruticuleuse, basse; feuilles ovales, finées-anguleuses, à piquans, presque glabres; piquans droits, blanchâtres.

L. n..... *h* Tige droite, roide. un peu rameuse, haute d'un pied; fl. blanches, f. pointues.

2374. MORELLE naine. Dict.

M. à piquans, frutescente; feuilles ovales, obtusément finées, à piquans, presque nues: piquans droits, blanchâtres.

L. n..... *h* Tige droite, ram., haute d'un pied & demi; fl. violettes; calice garni de piquans.

2375. MORELLE anguivi. Dict.

M. à piquans, fruticuleuse; feuilles ovales, finées-anguleuses, tom. en-dessous; calices inermes.

L. n. Madagascar. *h* [Herb. de M. Thouin.] Grappes latér. très-courtes. On mange ses baies.

2376. MORELLE arbuscule. Dict.

M. frutescente, à piquans, glabre; feuilles oblongues, lobées-pinnatifides, obtuses, à piquans: piquans recourbés.

L. n. le Cap de B.-Espérance. *h* Arbruste d'un pied & demi; feuilles petites; piquans blanchâtres; fl. blanches.

2377. MORELLE polyacanthé. Dict.

M. frutescente, très-piquante; à feuilles linéaires-lanceolées, un peu dentées, à piquans des deux côtés: piquans droits, en épingle.

L. n. Saint-Domingue. *h* De l'étang. pédonc. uniflores; baies très-petites.

2378. MORELLE de Bahama. Dict.

M. à tige frutiq. à piquans; feuilles lanceolées, onnées, obtuses, réfléchies sur les bords: grappes simples.

L. n. les Îles de l'Amérique. *h* Fl. violettes.

2372. SOLANUM coccineum.

S. fruticosum, aculeatum; foliis subcordatis; repandis, tomentosis, rariter aculeatis: baccis parvulis coccineis.

Ex..... *h* Jacq. miscell. 2. p. 329. ic. rar. vol. 1.

2373. SOLANUM rigidum.

S. aculeatum, frutescens, humile; foliis ovatis, sinuato-angulosis, aculeatis, nudiusculis: aculeis rectis, albidis.

Ex..... Hort. Paris. *h* Caulis erectus, rigidus pedalis; fol. acuta, fl. alb.

2374. SOLANUM humile.

S. aculeatum, frutescens, foliis ovatis, obtusè sinuatis, aculeatis, subnudis: aculeis rectis, albidis.

Ex..... Hort. Paris. *h* Caulis ram. erectus, sesquipedalis; fl. violacei; an S. capense. Suppl.

2375. SOLANUM anguivi.

S. aculeatum, fruticosum; foliis ovatis, sinuato-angulosis, subtus tomentosis; calycibus inermibus.

Ex Madagascaria. *h* Commerf. baccæ parvæ, rubræ, glabræ, esculentæ.

2376. SOLANUM milleri.

S. frutescens, aculeatum, glabrum: foliis oblongis, lobato-pinnatifidis, obtusis, aculeatis: aculeis recurvis.

E Cap. B.-Spei. *h* Jacq. collect. 4. p. 209. & ic. rar. vol. 2. An S. trilobatum. Lin.

2377. SOLANUM polyacanthos.

S. frutescens, aculeatissimum; foliis linearilanceolatis, subdentatis, utrinque aculeatis: aculeis rectis, acicularibus.

E Domingo. *h* Burm. amer. t. 224. f. 1. ped. uniflori; baccæ minimæ.

2378. SOLANUM bahamense.

S. caule aculeato, fruticoso; foliis lanceolatis, repandis, obtusis, margine, reflexis; racemis simplicibus.

Ex Insulis Americanis. *h* Dill. Elth. t. 271.

24 PENTANDRIE MONOGYNIE.

2379. MORELLE à piquans rouges. Dict.

M. à tige fruticuleuse, à piquans ; feuilles lancéolées, acuminées, très entières : piquans rouges ; grappes simples.

L. n. l'Amérique méridionale. $\bar{\eta}$ *Fl. blanches.*
Elle perd presque tous ses piquans par la culture.

2380. MORELLE de Buenos-ayres. Dict.

M. à tige fruticuleuse, garnie de piquans inférieurement ; feuilles ovales-oblongues, on-dées, sinuées, presque glabres, inermes.

L. n. les environs de Buenos-ayres. $\bar{\eta}$ *La tige des vieux pieds perd ses piquans.*

2381. MORELLE feuilles d'oseille. Dict.

M. subfrutescente, à piquans, glabre ; feuilles obtuses, sinuées, subpanduriformes : piquans très-petits, recourbés.

L. n. les Indes Orient. $\bar{\eta}$ *Sonnerat. fl. grandes ; cal. petit, mutique.*

2382. MORELLE micracanthe. Dict.

M. fruticuleuse, à piquans ; feuilles ovales, acuminées, un peu toment. en-dessous : piquans très-petits, rares, recourbés.

L. n. la Guadeloupe, le Brésil. $\bar{\eta}$

2383. MORELLE crotonoïde. Dict.

M. fruticuleuse, à piquans ; feuilles elliptiques-lancéolées, glabres en-dessus, tomenteuses en-dessous, inermes : piquans droits, un peu rares.

L. n. la Martinique. $\bar{\eta}$ *Jos. Martin. Rameaux, pétioles, ped. & calices tomenteux & blanchâtres ; sommités ferrugineuses.*

2384. MORELLE gigantesque. Dict.

M. fruticuleuse, à piquans ; feuilles ovales-lancéolées, inermes, blanches & tomenteuses en dessous : cyme tomenteuse, droite, subterminale.

L. n. le cap de B.-Espérance. $\bar{\eta}$ *Arbrisseau droit, s'élevant à plus de 10 pieds ; piquans courts, larges à leur base ; fl. d'un violet pâle.*

2385. MORELLE sarmenteuse. Dict.

M. à tige garnie de piquans, fruticuleuse, presque grimpante ; feuilles ovales-lancéolées, entières, un peu anguleuses, à piquans sur la côte & sur les pétioles.

PENTANDRIA MONOGYNIA.

2379. SOLANUM igneum.

S. caule aculeato, fruticoso ; foliis lanceolatis, acuminatis, integerrimis : aculeis rubris ; racemis simplicibus.

Ex America Merid. $\bar{\eta}$ *Pluk. t. 225. f. 5. fl. albi ; petalis angustis.*

2380. SOLANUM bonariense.

S. caule fruticoso, infernè aculeato ; foliis ovato-oblongis, sinuato-repandis, subnudis, inermibus.

Ex agro bonariensi. $\bar{\eta}$ *Dill. Elth. t. 272. fl. albi, magni, cymosi, nutantes.*

2381. SOLANUM acetosæfolium.

S. subfrutescens, aculeatum, glabrum : foliis obtusis, sinuatis, subpanduriformibus : aculeis minimis, recurvis.

Ex Indiis Orient. $\bar{\eta}$ *Cal. parvus, inermis ; cor. ampla.*

2382. SOLANUM micracanthos.

S. fruticosum, aculeatum : foliis ovatis, acuminatis, subtus tomentosiusculis : aculeis minimis, raris, recurvis.

E Guadelupa, Brasilia, $\bar{\eta}$

2383. SOLANUM crotonoides.

S. fruticosum, aculeatum ; foliis elliptico-lanceolatis, supra glabris, subtus tomentosius, inermibus : aculeis rectis, rariusculis.

E Martinica. $\bar{\eta}$ *An S. obscurum D. vahl. symb. 2. p. 41. tomentum breve, in summitatibus ferrugineum.*

2384. SOLANUM giganteum.

S. fruticosum, aculeatum ; foliis ovato-lanceolatis, inermibus, subtus incano-tomentosis : cyma tomentosa, erecta, subterminali.

E cap. B. Spei. $\bar{\eta}$ *Jacq. collect. 4. p. 125. & ic. rar. vol. 2. S. niveum, vahl. symb. 2. p. 41. fl. pallide violacei.*

2385. SOLANUM sarmentosum.

S. caule aculeato, fruticoso, subscandente ; foliis ovato-lanceolatis, integris, subangulatis, ad costam petiolorum aculeatis.

L. n.

PENTANDRIE MONOGYNIE.

L. n. l'Amérique mérid. *h F. glabres, lisses & mutiques en-dessus ; fl. blanches ; pét. lancéolés ; fruits rouges.*

2386. MORELLE *feuilles de fismbre*. Dict.

M. à piquans ; feuilles subbipinnatifides , velues , à piquans : à lobes dentés ; stigm. bilobé.

L. n. les environs de Buenos-Ayres. *h ?*

2387. MORELLE *cornue*. Dict.

M. à piquans ; feuilles pinnées-pinnatifides , à piquans : anthères inclinées , corniformes : l'inférieure très-grande , très-allongée.

L. n. le Brésil. *h ? Fl. jaunes, un peu irrégulières.*

* MORELLE [*chauve-fouris*] , à tige fruticueuse , à piquans ; feuilles en cœur , entières : corolles presque irrégulières ; anthère inf. plus allongée. *Des isles Canaries.*

Explication des fig.

Pl. 115. f. 1. MORELLE *sodomée*. (a) Fleur entière. (b) Corolle séparée. (c) Calice. (d) Baie entière. (e) La même coupée. (f) Sommité d'un rameau.

Pl. 115. f. 2. MORELLE *pomme-d'amour*. (a, b, c, d) Fleurs d'après Tournefort. (e, f) Fruit suivant le même.

Pl. 115. f. 3. MORELLE *multifide*.

Pl. 115. f. 4. MORELLE *pinnatifide*.

326. P I M E N T.

Chara. essent.

Cor. en roue : baie cortiqueuse , sèche , à 2 ou 3 loges.

Chara. nat.

Cal. monophylle , quinqueside , droit , persistant.

Cor. monopétale , en roue. Tube très-court. Limbe semi-quinqueside , plissé , ouvert : à découpures larges , pointues.

Etam. Cinq filamens très-petits , subulés. Anthères oblongues , conniventes.

Pist. Ovaire supérieur , ovale. Style filiforme , plus long que les étamines : stigmate obtus.

Botanique. Tome II.

PENTANDRIA MONOGYNIA. 25

Ex Amer. merid. h S. scandens, Swartz. prodr. 47. S. lanceæfolium. Jacq. collect. 2. p. 286. & ic. rar. vol. 2.

2386. SOLANUM *sifymbriifolium*.

S. aculeatum ; foliis subbipinnatifidis , villosis , aculeatis : lobis dentatis ; stigmatibus bilobis.

Ex agro Bonariense. h ? Commers. herb.

2387. SOLANUM *cornutum*.

S. aculeatum ; foliis pinnato-pinnatifidis , aculeatis : antheris declinatis , corniformibus ; infima maxima , productissima.

Ex Brasilia. h ? Fl. lutei, subinæquales.

* SOLANUM [*vespertilio*] , caule aculeato , fruticoso ; foliis cordatis , integris : corollis subirregularibus : anthera ima productiore. *Hort. Kew. 1. p. 252.*

Explicatio iconum.

Tab. 115. f. 1. SOLANUM *sodomeum*. (a) Flos integer. (b) Corolla separata. (c) Calyx. (d) Bacca integra. (e) Eadem dissecta. Fig. ex Tournef. (f) Summitas ramuli.

Tab. 115. f. 2. SOLANUM *lycopersicum*. (a, b, c, d) Flores ex Tournefortio. (e, f) Fructus ex eodem.

Tab. 115. f. 3. SOLANUM *multifidum*.

Tab. 115. f. 4. SOLANUM *pinnatifidum*.

326. C A P S I C U M.

Chara. essent.

Cor. rotata. Bacca corticosa , exsucca , 2 f. 3-locularis.

Chara. nat.

Cal. monophyllus , quinquesidus , erectus , persistens.

Cor. monopetala , rotata. Tubus brevissimus. Limbus semi-quinquesidus , plicatus , patens : laciniis latis , acutis.

Stam. Filamenta quinque minima , subulata. Antheræ oblongæ , conniventes.

Pist. Germen superum , ovatum. Stylus filiformis , staminibus longior : stigma obtusum.

D

26 PENTANDRIE MONOGYNIE.

Péric. Baie cortiqueuse, sans pulpe, ovale ou ovale-conique, à 2 ou trois loges, creuse, colorée. Récept. des sem. attachés à la cloison, desséchés.

Sem. nombreuses, réniformes, applaties.

Tableau des espèces.

2388. PIMENT annuel. Dict.

P. à tige herbacée; péduncules solitaires: fruits oblongs, pendans.

L. n. les Indes. ☉ *Vulg.* le poivre long.

2389. PIMENT à gros fruit. Dict.

P. à tige frutescente; fruits épais, presque cordiformes.

L. n. les Indes. ☿ *Le poivre de Guinée.*

2390. PIMENT conique. Dict.

P. à tige suffrutescente: fruits ovales-coniques, droits.

L. n. les Indes. ☿ *Capf. lob. ic. 317?*

2391. PIMENT cerise. Dict.

P. à tige suffrutescente: fruits subglobuleux, solitaires, droits.

L. n. le Brésil. ☿ *Fruit petit, céraforme.*

2392. PIMENT jaune. Dict.

P. à tige frutescente, flexueuse; rameaux & pétioles velus: fruits ovales, pendans, trilobulaires.

L. n. l'Inde. ☿ *Le piment de Mozambique.*

2393. PIMENT à petites baies. Dict.

P. à tige frutescente, lisse; péduncules subgeminés: fruits ovales, très-petits.

L. n. l'Amérique mérid. ☿.

2394. PIMENT de Chine. Dict.

P. à tige frutescente; péduncules fasciculés: fruits coniques, très-petits, pendans.

L. n. la Chine. ☿ *Fr. mucronés par le style.*

2395. PIMENT frutescent. Dict.

P. à tige frutescente; feuilles lancéolées: fruits oblongs, solitaires, presque droits.

L. n. les Indes orientales. ☿ *Sonnerat.*

PENTANDRIA MONOGYNIA:

Peric. Bacca corticosa, exsucca, ovata vel ovato-conica, bi f. trilocularis, cava, colorata. Recept. seminum dissepimento adnata, exsucca.

Sem. plurima, reniformia, compressa.

Conspectus specierum.

2388. CAPSICUM annum.

C. caule herbaceo; pedunculis solitariis: fructibus oblongis, propendentibus.

Ex Indiis. ☉ *Capf. actuarii; lob. ic. 316.*

2389. CAPSICUM grossum.

C. caule frutescente; fructibus erectis, incrassatis, subcordiformibus.

Ex Indiis. ☿ *Fructus mali ferè magnitudine.*

2390. CAPSICUM conicum.

C. caule suffrutescente: fructibus ovato-conicis, surrectis.

Ex Indiis. ☿ *Folia præcedentibus minora.*

2391. CAPSICUM cerasiforme.

C. caule suffrutescente: fructibus subglobosis, solitariis, erectis.

Ex Brasilia. ☿ *Piper siliqua parva. j. B. 2. 944.*

2392. CAPSICUM luteum.

C. caule frutescente, flexuoso; ramulis petiolisque hirsutis: fructibus ovatis, pendulis, trilobularibus.

Ex India. ☿ *Sonnerat. fr. lutei.*

2393. CAPSICUM baccatum.

C. caule frutescente, lævi; pedunculis subgeminis: fructibus minimis, ovalibus.

Ex America merid. ☿ *Fol. subtus nervosa.*

2394. CAPSICUM Sinese.

C. caule frutescente; pedunculis fasciculatis: fructibus conicis, minimis, pendulis.

Ex China. ☿ *Sonnerat. Jacq. hort. 3. t. 67.*

2395. CAPSICUM frutescens. T. 116. f. 2.

C. caule fruticoso; foliis lanceolatis: fructibus oblongis, solitariis, suberectis.

Ex Ind. orient. ☿ *Rumph. amb. 5. t. 88. f. 3.*

Explication des fig.

Pl. 116. f. 1. Fructification du Piment, d'après Tournefort. (a) Fleur entière. (b) Corolle séparée. (c) Calice. (d) Pistil. (e, f) Fruits entiers. (g, h) Les mêmes coupés en travers. (i) Semence séparée.

Pl. 116. f. 2. PIMENT frutescent. (a) Fleur séparée. (b) Corolle ouverte. (c) Calice. (d) Etamine. (e, f) Pistil. (g) Fruit coupé. (h) Rameaux, d'après le Sec.

327. COQUERET.

Charact. essent.

COR. en roue. Etam. conniventes. Baie 2-loculaire, recouv. par le calice enflé.

Charact. nat.

Cal. monophylle, petit, campanulé, persistant, semi-quinquefide : à découp. acuminées.

Cor. monopétale, en roue. Tube très-court. Limbe semi-quinquefide, grand, plissé : à découp. larges, pointues.

Etam. Cinq filaments subulés, très-petits. Anthères oblongues, droites, conniventes.

Pist. Ovaire supérieur, arrondi. Style filiforme, presque plus long que les étamines. Stigmate obtus.

Péric. Baie globuleuse, petite, subbiloculaire, recouverte par le calice grand, vésiculeux, subpentagone, fermé & coloré.

Sem. nombreuses, reniformes, applaties.

Tableau des espèces.

* Pl. frutescentes ou vivaces.

2396. COQUERET *somnifera*. Diâ. n°. 1.

C. à tige fruticuleuse ; rameaux tomenteux : feuilles entières ; fleurs ramassées.

L. n. l'Espagne, l'île de Candie. \bar{h}

β . Le même à rameaux en zig-zag ; feuilles plus larges.

2397. COQUERET *en arbre*. Diâ. n°. 2.

C. à tige fruticuleuse arborescente ; feuilles ovales, onquées, leg. dentées, tomenteuses en-dessous : fleurs la plupart fasciculées.

L. n. les env. de Campeche. \bar{h} Tige de 4 à 6 p.

Explicatio iconum.

Tab. 116. f. 1. Fructificatio Capfici, ex Tournefortio. (a) Flos integer. (b) Corolla separata. (c) Calyx. (d) Pistillum. (e, f) Fructus integri. (g, h) lidem transversim secti. (i) Semen separatum.

Tab. 116. f. 2. CAPSICUM frutescens. (a) Flos separatus. (b) Corolla aperta. (c) Calyx. (d) Stamen. (e, f) Pistillum. (g) Fructus dissectus. (h) Ramulus, ex Sicc.

327. PHYSALIS.

Charact. essent.

COR. rotata. Stam. conniventia. Bacca 2-locularis, calyce inflato tecta.

Charact. nat.

Cal. monophyllus, parvus, campanulatus, persistens, semi-quinquefidus : laciniis acuminatis.

Cor. monopetala, rotata. Tubus brevissimus. Limbus semi-quinquefidus, magnus, plicatus : laciniis latis, acutis.

Stam. Filamenta quinque subulata, minima. Anthæræ oblongæ, erectæ, conniventes.

Pist. Germen superum, subrotundum. Stylus filiformis, flaminibus ferè longior. Stigma obtusum.

Peric. Bacca globosa, parva, subbilocularis, calyce amplo, vesicario, subpentagono, clauso, coloratoque tecta.

Sem. plurima, reniformia, compressa.

Conspectus specierum.

* Pl. frutescentes vel perennes.

2396. PHYSALIS *somnifera*.

Ph. caule fruticoso ; ramis tomentosis : foliis integris ; floribus confertis.

Ex Hispania, Creta. \bar{h} Fl. parvi, axill.

β . Eadem ramis flexuosis ; foliis latioribus. P. flexuosa. Linn.

2397. PHYSALIS *arborescens*.

Ph. caule fruticoso, arborescente ; foliis ovatis, repando-dentatis, subtus tomentosis ; floribus subaggregatis.

Ex Campechia. \bar{h} Mill. diâ. t. 206. f. 2.

28 PENTANDRIE MONOGYNIE.

2398. COQUERET *f. d'origin.* Dict. suppl.
C. à tige fruticuleuse ; feuilles ovales , en-
tières , un peu onnées , obsc. tomenteuses :
fl. solitaires.

L. n. le Magellan. \bar{n} *Commers.*

2399. COQUERET *de Pensylvanie.* Dict. n°. 4.
C. à feuilles en cœur-ovales , onnées , un peu
nues ; tige herbacée : fleurs unicolores.

L. n. l'Amérique septentr. \bar{n}

2400. COQUERET *alkekengi.* Dict. n°. 6.
C. à feuilles geminées , ovales-pointues , en-
tières ; tige herbacée : calices frutif. très-
rouges.

L. n. l'Europe , aux l. ombragés. \bar{n}

2401. COQUERET *f. d'anferine.* Dict. suppl.
C. pubescent , à tige droite subfrutescente ;
feuilles presqu'en cœur , dentées , anguleuses :
pétioles decurrens.

L. n. le Pérou. \bar{n} ? *Fleurs jaunâtres , à 5 ta-
ches brunes.*

2402. COQUERET *visqueux.* Dict. n°. 5.
C. à feuilles geminées , onnées , obtuses , sub-
tamenteuses : tige herbacée , paniculée sup.

L. n. la Virginie , Buenos-Ayres. \bar{n}

* * *Pl. annuelles.*

2403. COQUERET *anguleux.* Dict. n°. 8.
C. très-rameux , à rameaux anguleux , gla-
bres ; feuilles ovales , dentées.

L. n. les Indes orient. & occid. \odot

2404. COQUERET *de Philadelph.* Dict. n. 10.
C. très-rameux , glabre ; feuilles ovales , on-
nées , dentées : pédoncules plus courts que la
fleur.

L. n. l'Amérique septentr. \odot

2405. COQUERET *pubescens.* Dict. n°. 9.
C. très-rameux , à feuilles presqu'en cœur ,
dentées , velues , visqueuses : péd. penchés ,
courts.

L. n. l'Amérique. \odot

β . *Le même à f. plus larges ; pédoncules presque
droits.*

PENTANDRIA MONOGYNIA.

2398. *PHYSALIS origanifolia.*

Ph. caule fruticoso ; foliis ovatis , integris ,
subrepandis , obsolete tomentosis : floribus
solitariis.

Ex Magellania. \bar{n} *An ph. curassavica. l. ?*

2399. *PHYSALIS Pensylvanica.*

Ph. foliis cordato-ovatis ; repandis , nudius-
culis ; caule herbaceo : floribus unicoloribus.

Ex America septentr. \bar{n}

2400. *PHYSALIS alkekengi.*

Ph. foliis geminis , ovato-acutis integris ;
caule herbaceo : calycibus fructiferis , ruber-
rimis.

Ex Europa , in umbrosis. \bar{n} *ped. 1-flori.*

2401. *PHYSALIS chenopodifolia.*

Ph. pubescens , caule erecto , subfrutescente ;
foliis subcordatis , dentato-angulatis : petiolis
decurrentibus.

E Peru. \bar{n} ? *An Phys. peruviana. Lin.*

2402. *PHYSALIS viscosa.*

Ph. foliis geminis , repandis , obtusis , sub-
tomentosis : caule herbaceo , supernè pani-
culato.

Ex Virginia , Bonaria. \bar{n}

* * *Pl. annuæ.*

2403. *PHYSALIS angulata.*

Ph. ramossissima , ramis angulatis , glabris : fo-
liis ovatis , dentatis.

Ex utrisque Indiis. \odot *Dill. Elth. t. 12. f. 12.*

2404. *PHYSALIS Philadelphica.*

Ph. ramossissima , glabra ; foliis ovatis , re-
pando-dentatis ; pedunculis flore brevioribus.

Ex America septentr. \odot

2405. *PHYSALIS pubescens.*

Ph. ramossissima ; foliis subcordatis , den-
tatis , villosis - viscosis : pedunculis cernuis ,
brevibus.

Ex America. \odot

α . *Eadem foliis latioribus ; pedunculis sube-
rectis. Alkekengi barbadense , &c. Dill. Elth.
t. 9. f. 9.*

2406. COQUERET *nouveux*. Dict. suppl.

C. herbacé, rameux ; à géciculatons nouet-
fes : feuilles ovales-oblongues, comme ron-
gées, pubescentes ; fleurs pendantes.

L. n. l'Amérique. ☉ *Fl. petites*.

2407. COQUERET à *feuilles larges*.

C. droit, rameux, velu, pubescent ; à feuilles
en cœur, presque entières : pédoncules courts,
penchés.

L. n. l'Amérique. ☉ *Coq. de Barbade*. Dict.
n°. 12. *Pédoncules uniflores*.

2408. COQUERET *couché*. Dict. n°. 15.

C. très-rameux, couché, hispide ; à feuilles
presqu'ovales, obsc. anguleuses, inégales à
leur base : corolles campanulées.

L. n. le Pérou. ☉ *Tige & feuilles succulentes ;*
calices scarieux ; corolles grandes, d'un violet
bleuâtre.

2409. COQUERET *nain*. Dict. n°. 11.

C. très-rameux ; à pédoncules fructifères, plus
longs que les feuilles velues.

L. n. les Indes. ☉ *Je doute de sa synonymie*.

* * * (Les nicandres) *calices à angles*
tranch. sub5-phylles.

2410. COQUERET *f. de stramoine*. Dict. 13.

C. rameux, glabre, à feuilles ovales, den-
rées-anguleuses ; calices du fruit à angles tran-
chans.

L. n. le Pérou. ☉ *Tige droite ; fl. bleuâtres*.

2411. COQUERET *d'Inde*. Dict. n°. 14.

C. rameux, glabre ; à feuilles ovales-lancéo-
lées, entières, lisses : calices du fruit à angles
tranchans.

L. n. les Indes orient. *Sonnerat*.

* COQUERET (*aristé*), à tige fruticueuse ;
feuilles oblongues, entières, glabres : rameaux,
pétioles & pédoncules lanugineux ; dents cali-
cinales aristées. *Des Canaries*. *Var. du coq. som-*
nifère ?

Explication des fig.

Pl. 116. f. 1. Fructification du Coqueret *Alkekengi*,
d'après Tournefort. (*a, b*) Fleur entière, vue en-
dessus & en-dessous. (*c*) Corolle séparée. (*d*) Calice. (*e*)
Pistil. (*f, g*) Calice du fruit. (*h*) Baie. (*i*) La même
coupée transversalement. (*l*) Semences.

2406. PHYSALIS *nodosa*.

Ph. herbacea, ramosa : geniculis nodosis ; fo-
liis ovato-oblongis, suberosis, pubescentibus :
floribus pendulis.

Ex America. ☉ *A præced. diversa*.

2407. PHYSALIS *latifolia*.

Ph. erecta, ramosa, villosa-pubescentibus ; foliis
cordatis, subintegerrimis ; pedunculis brevi-
bus, nutantibus.

Ex America. ☉ *Ph. Barbadenfis*. Dict. n°. 12.
Excluso Jacquini synonymo.

2408. PHYSALIS *prostrata*. T. 116. f. 2.

Ph. ramosissima, prostrata, hispida ; foliis
subovatis, obsolete angulatis, basi inæquali-
bus : corollis campanulatis.

E Peru. ☉ *Jacq. collect. 1. p. 99. & ic. rar.*
l'hérit. stirp. t. 22. phys. limensis. Retz. fasc.
5. n°. 54.

2409. PHYSALIS *minima*.

Ph. ramosissima ; pedunculis fructiferis, folio
villosa longioribus. l.

Ex Indiis. ☉

* * * (Nicandræ) *calyces acutanguli*,
sub5-phylli.

2410. PHYSALIS *daturæfolia*.

Ph. ramosa, glabra ; foliis ovatis, dentato-
angulatis : calycibus fructescentibus, acutan-
gulis.

E Peru. ☉ *Alkekengi..... few. t. 16*.

2411. PHYSALIS *Indica*.

Ph. ramosa, glabra ; foliis ovato-lanceolatis,
integris, lævibus : calycibus fructescentibus,
acutangulis.

Ex Indiis orient. *Barrel. ic. 1129*.

* PHYSALIS (*aristata*) caule fruticoso ; foliis
oblongis, integris, glabris : ramis, petiolis pe-
dunculisque lanuginosis ; denticulis calycinis,
aristatis. *Hort. Kew. 1. p. 244*.

Explicatio iconum.

Tab. 116. f. 1. Fructificatio *Phys. Alkekengi*, ex
Tournefortio. (*a, b*) Flos integer, desuper infraque
visus. (*c*) Corolla separata. (*d*) Calyx. (*e*) Pistillum.
(*f, g*) Calyx fructus. (*h*) Bacca. (*i*) Eadem transver-
sim secta. (*l*) Semina.

30 PENTANDRIE MONOGYNIE.

Pl. 116. f. 2. COQUERET couché. (a) Partie supérieure d'un rameau. (b, c) Fleurs entières. (d) Cor. coupée. (e) Etamine séparée. (f) Calice. (g) Pistil. (h, i) Calice du fruit. (l) Baie détachée.

328. JUSQUIAME.

Charact. essent.

COR. infundibulif., irrégulière, à 5 lobes. Etam. inclinées. Capf. operculée, 2-loculaire.

Charact. nat.

Cal. monophylle, tubuleux, un peu ventru inférieurement, persistant : à bord divisé en cinq déc. droites, pointues.

Cor. monopétale, infundibuliforme. Tube court. Limbe irrégulier, ouvert obliquement, à cinq lobes : une découp. plus large que les autres.

Etam. Cinq filamens subulés, inclinés, attachés à la base du tube. Anthères ovales.

Pist. Ovaire supérieur, arrondi-ovale. Style filiforme, de la longueur des étamines. Stigmate en tête.

Péric. Capsule ovale, obtuse, un peu ventrue à la base, marquée d'un sillon de chaque côté, coupée en travers sup., & s'ouvrant par un opercule.

Réceptacles seminifères, demi-ovales, opposés, attachés à la cloison.

Sem. nombreuses, petites, irrégulières.

Tableau des espèces.

2412. JUSQUIAME noire. Dict. n°. 1.

J. à feuilles amplexicaules, sinuées, laciniées, très-molles : fleurs presque sessiles.

L. n. les lieux incultes & fertiles de l'Eur. ♂.

2413. JUSQUIAME *reticulée*. Dict. n°. 2.

J. à feuilles caulinaires, subpétiolées, sinuées-laciniées, presque glabres : corolle pourpre ; veineuse-reticulée.

L. n. le Levant. ♂ F, radicales ; obtuses.

2414. JUSQUIAME *blanche*. Dict. n°. 3.

J. à feuilles pétiolées, sinuées, obtuses ; fleurs sessiles.

L. n. l'Europe australe. ☉

PENTANDRIA MONOGYNIA.

Tab. 116. f. 2. PHYSALIS prostrata. (a) Pars superior ramuli. (b, c) Flores integri. (d) Corolla dissecta. (e) Stamen separatum. (f) Calyx. (g) Pistillum. (h, i) Calyx fructus. (l) Bacca soluta.

328. HYOSCYAMUS.

Charact. essent.

COR. infundibuliformis, inæqualis, 5-loba. Stam. inclinata. Capf. operculata, 2-ocularis.

Charact. nat.

Cal. monophyllus, tubulosus, infernè subventricosus, persistens ; ore quinquefido : laciniis acutis, erectis.

Cor. monopetala, infundibuliformis. Tubus brevis. Limbus inæqualis, obliquè patens, quinquelobus : lacinia unica reliquis latiore.

Stam. Filamenta quinque subulata, inclinata, basi tubi inserta. Antheræ ovatae.

Pist. Germen superum, subrotundo-ovatum. Stylus filiformis, longitudine flaminum. Stigma capitatum.

Peric. Capsula ovata, obtusa, basi subventricosa, utrinque sulco insculpta, bilocularis, supernè circumscissa, operculo dehiscente.

Receptacula seminifera, dimidiato-ovata, opposita, dissepimento affixa.

Sem. plurima, parva, inæqualia.

Conspectus specierum.

2412. HYOSCYAMUS *niger*.

H. foliis amplexicaulibus, sinuato-laciniatis, mollissimis : floribus subsessilibus.

Ex Europæ ruderatis, pinguibus. ♂.

2413. HYOSCYAMUS *reticulatus*.

H. foliis caulinis, subpetiolatis, sinuato-laciniatis, nudiusculis : corolla purpurea, venoso-reticulata.

Ex Oriente. ♂ Camer. hort. t. 22.

2414. HYOSCYAMUS *albus*. T. 117. f. 2.

H. foliis petiolatis, sinuatis, obtusis : floribus sessilibus. l.

Ex Europa australi. ☉ Blackw. t. 222.

PENTANDRIE MONOGYNIE.

PENTANDRIA MONOGYNIA. 31

2415. JUSQUIAME *dorée*. Dict. n°. 4.
J. à feuilles pétiolées, anguleuses-dentées :
fleurs pédunculées, à limbe jaune.
L. n. l'Europe australe, le Levant. \mathcal{P}

2416. JUSQUIAME *feuell. de bête*. Dict. n°. 5.
J. à feuilles pétiolées, ovales-lancéolées,
dentées-anguleuses, lisses : bractées entières.
L. n. l'Arabie, l'Égypte. σ Pétioles longs.

2417. JUSQUIAME *flurette*. Dict. n°. 6.
J. à feuilles lancéolées, dentées ; les florales
inférieures geminées : calices épineux.
L. n. la Perse. \odot Tige grêle de 5 à 6 pouces.

2418. JUSQUIAME *de Sibérie*. Dict. n°. 7.
J. à feuilles ovales, très-entières ; calices sub-
tubuleux : les fructifères enflés-globuleux.
L. n. la Sibérie. \mathcal{P} Cor. d'un violet pâle.

2419. JUSQUIAME *fl. pendantes*. Dict. n°. 8.
J. à feuilles, ovales, entières ; fleurs penda-
ntes : calice glabre, hémisphérique.
L. n. la Carniole. \mathcal{P} Cal. court.

Explication des fig.

Pl. 117. f. 1. Fructification de la Jusquiame, d'après
Tournefort. (a) Fleur entière. (b) Corolle séparée. (c)
Calice. (d) Calice ouvert, pistil. (e) Calice fructifère.
(f) Le même coupé, montrant la capsule. (g, h)
Capsule avec son opercule séparé. (i) Receptacle des
semences. (l) Semences séparées. (m) Opercule vu
par-dessous.

Pl. 117. f. 2. JUSQUIAME *blanche*. (a) Partie supé-
rieure de la tige. (b) Capsule fermée. (c) La même
ouverte. (d) La même coupée transversalement. (e)
Semences. (f, g) Les mêmes coupées diversement.

329. M O L È N E.

Charact. essent.

COR. en roue, presque régul. Filam. barbus.
Capf. 2-loculaire, polysperme.

Charact. nat.

Cal. monophylle ; quinqueside, persistant ; à
découp. ovales-lancéolées, droites.

Cor. monopétale, en roue, un peu irrégulière.
Tube très-court Limbe ouvert, partagé en
cinq lobes ovales, obtus.

2415. HYOSCYAMUS *aureus*.
H. foliis petiolatis, anguloso-dentatis ; floribus
pedunculatis : limbo aureo.
Ex Europa australi, Oriente. \mathcal{P}

2416. HYOSCYAMUS *betæfolius*.
H. foliis petiolatis, ovato-lanceolatis, den-
tato-angulosis, lævibus : bracteis indivisis.
Ex Ar. Ægyp. σ H. muticus. L. H. datora. f.

2417. HYOSCYAMUS *pufillus*.
H. foliis lanceolatis, dentatis : floralibus in-
ferioribus, binis : calycibus spinosis.
Ex Persia. \odot Pluk. t. 37. f. 5.

2418. HYOSCYAMUS *physaloides*.
H. foliis ovatis, integerrimis ; calycibus sub-
tubulosis : fructifcentibus inflato-globosis.
Ex Sibir. \mathcal{P} Lin. amæn. Acad. 7. t. 6. f. 1.

2419. HYOSCYAMUS *scopolia*.
H. foliis ovatis, integris ; floribus pendulis ;
calyce lævi, hemisphærico.
Ex Carniolia. \mathcal{P} Jacq. obs. 1. t. 20.

Explicatio iconum.

Tab. 117. f. 1. Fructificatio Hyoscyami, ex Tour-
nefortio. (a) Flos integer. (b) Corolla separata. (c)
Calyx. (d) Calyx apertus, pistillum. (e) Calyx fruc-
tifer. (f) Idem excisus, capsulam exhibens. (g, h)
Capsula cum operculo soluto. (i) Receptaculum se-
minum. (l) Semina separata. (m) Operculum infra spec-
ratum.

Tab. 117. f. 2. HYOSCYAMUS *albus*. (a) Pars su-
perior caulis. (b) Capsula clausa. (c) Eadem dehiscens.
(d) Eadem transversim secta. (e) Semina. (f, g) Eadem
dissecta. Fig. ex Gartn.

329. V E R B A S C U M.

Charact. essent.

COR. rotata, subæqualis. Filam. barbata. Capf.
2-ocularis, polysperma.

Charact. nat.

Cal. monophyllus, quinquesidus, persistens : la-
ciniis ovato-lanceolatis, erectis.

Cor. monopetala, rotata, subinæqualis. Tubus
brevissimus. Limbus patens, quinquepartitus :
laciniis ovatis, obtusis.

32 PENTANDRIE MONOGYNIE.

Etam. Cinq filamens filiformes, inégaux, plus courts que la corolle, barbus inférieurement. Anth. comprimées, arrondies ou réniformes.

Pist. Ovaire supérieur, arrondi. Style filiforme, incliné, de la longueur des étamines. Stigmate un peu épais, obtus.

Péric. Capsule ovale ou globuleuse, biloculaire, bivalve, s'ouvrant par le sommet. Placentas demi-ovales, attachés à la cloison. Cloison double, formée par les bords rentrants des valves.

Sem. nombreuses, ovales, légèrement anguleuses.

Tableau des espèces.

2420. *MOLÈNE officinale*. Dict. n°. 1.
M. à feuilles presque ovales, décurrentes, tomenteuses de chaque côté; tige simple.

L. n. l'Europe, aux lieux incultes. ♂

«. La même à stigmate bilobé.

2421. *MOLÈNE thapsoïde*. Dict. n°. 2.
M. à feuilles oblongues, décurrentes, tomenteuses de chaque côté: tige rameuse.

L. n. ♂ Fl. plus petites que dans la précéd.

2422. *MOLÈNE phlomoïde*. Dict. n°. 3.
M. à feuilles ovales, toment. de chaque côté: les inférieures pétiolées,

L. n. la France, l'Allemagne, l'Italie. ♂

2423. *MOLÈNE mucronée*. Dict. n°. 4.
M. à tige très-haute, roide, rameuse au sommet; feuilles un peu décurrentes, toment. de chaque côté; les supérieures très-mucronées

L. n. l'île de Candie. ♂ Tige de 6 à 8 pieds.

2424. *MOLÈNE lychnite*. Dict. n°. 5.
M. à feuilles ovales lancéolées, presque glabres en-dessus: les inf. pétiolées; épis racémiformes.

L. n. l'Europe, aux l. incultes. ♂ Epis longs, lâches.

2425. *MOLÈNE noire*. Dict. n°. 6.
M. à feuilles pétiolées, en cœur-oblongues, presque glabres en-dessus.

L. n. l'Europe, aux l. incultes. ♀ Fl. jaunes; étam. hérissées de poils pourpres.

PENTANDRIA MONOGYNIA.

Stam. Filamenta quinque filiformia, inæqualia, corolla breviora, infernè barbata. Antheræ compressæ, subrotundæ vel reniformes.

Pist. Germen superum; subrotundum. Stylus filiformis, inclinatus, longitudine flaminum. Stigma crassiusculum, obtusum.

Peric. Capsula ovata vel globosa, bilocularis, bivalvis, supernè dehiscens. Receptacula femininum dimidiato ovata, dissepimento affixa. Dissepimentum duplicatum, ex inflexis valvarum marginibus.

Sem. numerosa, ovata, subangulata.

Conspectus specierum.

2420. *VERBASCUM thapsus*.
V. foliis subovatis, decurrentibus, utrinque tomentosis: caule simplici.

Ex Europæ ruderatis. ♂

«. Idem stigmate bilobo. Verb. Bicolle.

2421. *VERBASCUM thapsoïdes*.
V. foliis oblongis, decurrentibus, utrinque tomentosis: caule ramoso.

Ex Europa. ♂

2422. *VERBASCUM phlomoides*.
V. foliis ovatis, utrinque tomentosis: inferioribus petiolatis.

Ex Gallia, Germania, Italia. ♂

2423. *VERBASCUM mucronatum*.
V. caule altissimo, stricto, apice ramoso; foliis subdecurrentibus, utrinque tomentosis; supremis argutè mucronatis.

Ex Candia. ♂ La Billardière.

2424. *VERBASCUM lychnitis*.
V. foliis ovato-lanceolatis, nudiusculis; inferioribus petiolatis: spicis racemiformibus.

Ex Europæ ruderatis. ♂ Flores parvi, subalbidi.

2425. *VERBASCUM nigrum*.
V. foliis petiolatis, cordato-oblongis, supernè nudiusculis.

Ex Europæ ruderatis. ♀ Filam. flaminum villosa, purpurea.

2426.

2426. MOLÈNE à feuilles d'ortie. Dict. n°. 7.
M. à feuilles pétiolées, presqu'en cœur, grossièrement dentées; corolles ponctuées.

L. n. . . . F. presque glabres en-dessus.

2427. MOLÈNE de Chaix. Dict. n°. 8.

M. à feuilles pétiolées, presqu'en cœur, crénelées, incisées, en lyre à la base, vertes; grappé paniculée.

L. n. la Fr. austr. ♂ Esp. voisine de la précéd.

2428. MOLÈNE sinuée. Dict. n°. 9.

M. à feuilles radicales, pinnatifides, onduées, tomenteuses; les caulin. amplexicaules, presque glabres: les rameaux premières opposées.

L. n. la France australe. ♂ Tige fort rameuse.

2429. MOLÈNE ondulée. Dict. n°. 10.

M. tomenteuse, à feuilles rad. sinuées; crépues; les caulinaires sessiles, entières; tige effilée: fleurs sessiles.

L. n. le Levant. La Billardière. Tige foible, à rameaux lâches.

2430. MOLÈNE à petites fleurs. Dict. n°. 11.

M. à feuilles pinnatifides-runcinées, tomenteuses des 2 côtés, radicales; tige rameuse, presque nue: fleurs très-petites.

L. n. le Levant? (Herb. de M. Jussieu.)

2431. MOLÈNE épineuse. Dict. n°. 12.

M. à tige feuillée, épineuse, frutescente.

L. n. l'île de Candie. ♂ Tige très-rameuse.

2432. MOLÈNE en lyre. Dict. n°. 13.

M. velue, à feuilles radicales, en lyre-pinnées; les caulinaires inégalement dentées, presque sessiles: calice pentaphylle denté.

L. n. l'Espagne? Tige simple, droite.

2433. MOLÈNE de Boerhave. Dict. n°. 14.

M. à feuilles presqu'en lyre; fleurs sessiles.

L. n. l'Europe australe. ☉

2434. MOLÈNE ferrugineuse. Dict. n°. 15.

M. à feuilles un peu velues, ridées; les cau-
Botanique. Tome II.

2426. VERBASCUM *urticæfolium*.

V. foliis petiolatis, subcordatis, grossè serratis: corolla punctata.

Ex V. nigro affinis.

2427. VERBASCUM *Chaixi*.

V. foliis petiolatis, subcordatis, crenatis, basi inciso-lyratis, viridibus; racemo paniculato.

Ex Gallia austr. ♂ Vill. Delph. 2. t. 13.

2428. VERBASCUM *sinuatum*.

V. foliis radicalibus, pinnatifido-repandis, tomentosis; caulinis amplexicaulibus, nudiusculis: rameis primis, oppositis.

Ex Gallia austr. ♂ V. laciniatum. Lugd. 1302.

2429. VERBASCUM *undulatum*.

V. tomentosum; foliis radicalibus, sinuato-crispis; caulinis sessilibus, indivisis: caule virgato; floribus sessilibus.

Ex Oriente. V. græcum, fruticosum; folio sinuato, candidissimo. Tournes. it. 1. p. 335.

2430. VERBASCUM *parviflorum*.

V. foliis pinnatifido-runcinatis, utrinque tomentosis, radicalibus; caule ramoso, nudiusculo: floribus minimis.

Ex Oriente? Folia taraxaci at tomentosa.

2431. VERBASCUM *spinosum*.

V. caule folioso, spinoso, frutescente. L.

Ex Candia. ♂ Pr. alp. exot. t. 36.

2432. VERBASCUM *lyratum*.

V. hirsutum; foliis radicalibus, lyrato pinnatis: caulinis inæqualiter dentatis, subsessilibus; calyce pentaphyllo, serrato.

Ex Hispania? Fol. radicalia Raphani.

2433. VERBASCUM *Boerhavi*.

V. foliis sublyratis; floribus sessilibus.

Ex Europa australi. ☉ Mill. ic. t. 273.

2434. VERBASCUM *ferrugineum*.

V. foliis subvillosis, rugosis; caulinis sub-

34 PENTANDRIE MONOGYNIE.

linaires presque sessiles, à crénelures régulières; les radicales oblongues, doublement crénelées.

L. n. l'Europe australe. ϖ *Fl. ferrugineuses.*

2435. MOLÈNE *purpure*. Dict. n°. 16.

M. à feuilles presque glabres: les radicales oblongues-ovales, crénelées; les caulinaires en cœur, presque entières: pédonc. solitaires.

L. n. l'Eur. austr. ♂ *Cor. d'un pourpre violet.*

2436. MOLÈNE *blattaire*. Dict. n°. 17.

M. à feuilles glabres; les radicales oblongues, pinnatifides sinuées; les caulinaires en cœur-lanceolées, dentées: pédoncules solitaires.

L. n. l'Europe. ♂ *Herbe aux mites.*

2437. MOLÈNE *blattariode*. Dict. n°. 18.

M. à feuilles presque glabres, oblongues, amplexicaules; les radicales, sinuées-crénelées: pédoncules très-courts, subbiflores.

L. n. Pédoncules geminées; *cor. jaune.*

2438. MOLÈNE *feuilles de bugle*. Dict. n. 19.

M. à feuilles radicales, nues, ovales; à longs pétioles: les caulinaires sessiles: tige simple.

L. n. le Levant. *Cor. verdâtre, rayée de jaune.*

2439. MOLÈNE *à tige nue*. Dict. n°. 20.

M. à feuilles laineuses, ridées, radicales; hampe nue.

L. n. les Pyrénées. ϖ *Fl. violettes.*

* MOLÈNE (*hémorroïdale*) à feuilles ovales-oblongues, rétrécies à la base, tomenteuses, obscurément crénelées; grappes allongées, spiciformes: faisceaux de fleurs sans bractées. (*L'île de Madère.*) ♂

* MOLÈNE (*pulvérulente*) à tige rameuse; calices farineux, fasciculés: fleur jaune. (*La France australe.*) ♂

Explication des fig.

Pl. 117. f. 1. MOLÈNE *officinale*. (a) Fleur ouverte. (b) Corolle séparée. (c, d) Calice, pistil. (e) Capsule entière. (f, g) La même coupée. (h, i) Semences séparées, avec leur réceptacle mis à nud. (i) Sommité de la tige.

PENTANDRIA MONOGYNIA.

sessilibus æqualiter crenatis: radicalibus oblongis, cordatis, duplicatio crenatis.

Ex Europa australi. ϖ *Hort. Kew. n°. 7.*

2435. VERBASCUM *phæniceum*. T. 117. f. 2.

V. foliis subglabris: radicalibus oblongo-ovatis, crenatis; caulinis cordatis, subintegris: pedunculis solitariis.

Ex Europa australi. ♂ *Cor purpureo-violacea.*

2436. VERBASCUM *blattaria*.

V. foliis glabris: radicalibus oblongis, pinnatifido sinuatis; caulinis cordato-lanceolatis, dentatis: pedunculis solitariis.

Ex Europa. ♂ *Cor. lutea; alba in var.*

2437. VERBASCUM *blattarioides*.

V. foliis nudiusculis, oblongis, amplexicaulibus; radicalibus sinuato-crenatis: pedunculis brevissimis subbifloris.

Ex *Hort. Paris.*

2438. VERBASCUM *bugulæfolium*.

V. foliis radicalibus, ovatis, longè petiolatis, nudis; caulinis sessilibus: caule simplici.

Ex Oriente. *Tournef. it. 2. t. 181.*

2439. VERBASCUM *myconi*.

V. foliis lanatis, rugosis, radicalibus; scapo nudo.

Ex Pyrenæis. ϖ *Fl violacei.*

* VERBASCUM (*hæmorroidale*) foliis ovato-oblongis, basi attenuatis, tomentosis, obsolete crenatis; racemis elongatis, spiciformibus: fasciculis florum ebracteatis. *Hort. Kew. n°. 4.*

* VERBASCUM (*pulverulentum*) caule ramoso; calycibus farinosis, fasciculatis: flore luteo. *Vill. delph. 2. p. 490.*

Explicatio iconum.

Tab. 117. f. 1. VERBASCUM *thapsus*. (a) Flos expansus. (b) Corolla separata. (c, d) Calyx, pistillum. (e) Capsula integra. (f, g) Eadem dissecta. (h, i) Semina separata, cum receptaculo denudato. *Fig. ex Tournef. (i) Summitas caulis.*

PENTANDRIE MONOGYNIE.

Pl. 117. f. 2. MOLENE *purpure*. (a) Partie supérieure de la tige. (b) Feuille radicale. (d) Capsule entière. (e) La même ouverte. (f) Sa coupe transversale. (g) Une de ses valves vue de côté interne. (h, i) Semences séparées. (l, m) Les mêmes coupées en divers sens.

330. CALAC.

Charact. essent.

CAL. court. Cor. infundibulif. 5-fide. Baie à 2-locos.

Charact. nat.

Cal. fort petit, quinquesfide, pointu, persistant. *Cor.* monopétale, infundibuliforme. Tube beaucoup plus long que le calice, cylindrique, plus ventru à l'orifice. Limbe ouvert, partagé en cinq découp. oblongues, pointues, plus courtes que le tube.

Etam. Cinq filamens très courts, attachés au sommet du tube. Anthères oblongues à l'orifice.

Pist. Ovaire supérieur, arrondi. Style filiforme, de la longueur du tube. Stigmate un peu épais, subbifide.

Péric. Baie presque globuleuse, petite, biloculaire : à cloison mince, membraneuse.

Sem. solitaires ou geminées, ovales, un peu comprimées.

Tableau des espèces.

2440. CALAC à feuilles obtuses. Dict. n°. 1.
C. à feuilles elliptiques, obtuses.
L. n. l'Inde. $\bar{\eta}$ Arbrisseau épineux, très-ram.

2441. CALAC feuilles de saule. Dict. n°. 2.
C. à feuilles lancéolées-oblongues, mucronées, plus étroites vers leur pétiole.
L. n. l'Inde. $\bar{\eta}$ Fl. petites.

2442. CALAC mirtoïde.
C. à feuilles ovales, pointues.
L. n. les Indes orientales. $\bar{\eta}$ Cal. à feuilles ovales. Dict. n°. 3. Rameaux dichotomes.

2443. CALAC d'Arabie. Dict. suppl.
C. à feuilles ovales-pointues, sans veines ; rameaux velusupérieurement ; déc. de la cor. lancéolées-linéaires.
L. n. l'Arabie. $\bar{\eta}$ Feuilles roides, glâbres, presque sessiles ; rameaux dichotomes.

PENTANDRIA MONOGYNIA. 35

Tab. 117. f. 2. VERBASCUM *phaniceum*. (a) Pars superior caulis. (b) Folium radicale. Fig. ex Sicc. (d) Capsula integra. (e) Eadem dehiscens. (f) Ejus sectio transversalis. (g) Valvula a parte interna spectata. (h, i) Semina separata. (l, m) Eadem dissecta. Fig. ex Gartn.

330. CARISSA.

Charact. essent.

CAL. brevis. Cor. infundibulif. 5-fida. Bacca 2-locularis.

Charact. nat.

Cal. minimus, quinquesfidus, acutus, persistens. *Cor.* monopétala, infundibuliformis. Tubus calyce multo longior, cylindricus, fauce ventricosior. Limbus quinquepartitus patens : laciniis oblongis, acutis, tubo brevioribus.

Stant. Filamenta quinque brevissima, apici tubi inserta. Antheræ oblongæ, intra faucem.

Pist. Germen superum, subrotundum. Stylus filiformis, longitudine tubi. Stigma crassiusculum, subbifidum.

Peric. Bacca subglobosa, parva, bilocularis : dissepimento tenui membranaceo.

Sem. solitaria vel bina, ovata, subcompressa.

Conspectus specierum.

2440. CARISSA carandas. T. 118. f. 1.
C. foliis ellipticis, obtusis. L.
Ex India. $\bar{\eta}$ Flores jasmino similes.

2441. CARISSA salicina.
C. foliis lanceolato-oblongis, mucronatis, versus petiolum angustioribus.
Ex India. $\bar{\eta}$ Sonnerat.

2442. CARISSA spinarum. T. 118. f. 2.
C. foliis ovatis, acutis.
Ex Indiis orientalibus. $\bar{\eta}$ Fol. ut in 2 præcedentibus exquisitè venosa.

2443. CARISSA edulis.
C. foliis ovatis, acutis, aveniis ; ramis superne villosis ; laciniis corollæ lanceolato-linéaribus.
Ex Arabia. $\bar{\eta}$ Antura. Forsk. p. 63. C. edulis. Vahl. symb. 1. p. 22.

2444. CALAC d'Afrique. Dict. n°. 4.

C. à feuilles en cœur-ovales ; mucronées , presque sans veines , persistantes ; épine bifide au sommet.

L. n. le Cap de Bonne-Espérance ; 7. Feuilles du Fragon piquant. Fl. blanches.

Explication des fig.

Pl. 118. f. 1. CALAC à feuilles obtuses. (a) Rameau séparé. (b) Fleurs. (c) Corolle ouverte. (d) La même avec les étamines saillantes. (e, f) Calice, pistil. (g) Fruit entier. (h) Le même coupé. (i) Semence.

Pl. 118. f. 2. CALAC mirtoïde.

331. G Y N O P O G O N.

Charact. essent.

CAL. 5-fide, persistant. Cor. infundibuliforme, ventrue sous l'orifice, velue int. Baie pédicellée : à noyau subbiloculaire.

Charact. nat.

Cal. monophylle, très-petit, persistant, semiquinqueside : à découpl. linéaires, pointues, droites.

Cor. monopétale, infundibuliforme. Tube cylindrique, plus long que le calice, ventru sous le limbe, resserré à l'orifice. Limbe plane, partagé en cinq découpures ovales.

Etam. Cinq filamens, très courts, attachés au-dessus de la partie moyenne du tube de la corolle. Anthères droites, linéaires, à l'entrée du tube.

Pist. Ovaire supérieur, ovale. Style filiforme, plus court que le tube. Stigmate globuleux, didyme, velu au sommet.

Péric. Baie pédicellée, ovale-globuleuse, coriace, contenant un noyau cartilagineux, subbiloculaire.

Sem. presque solitaires, souvent avortées.

Tableau des espèces.

* GYNOPOGON (étoilé) à feuilles verticillées trois à trois, lancéolées. Dict. vol. 3. pag. 62.

2444. CARISSA arduina.

C. foliis cordato-ovatis, mucronatis, sub-
aveniis, perennantibus ; spinis apice bifidis.

E Cap. B. Spei. 7. Arduina hispidosa, L. Primus ad proprium genus hanc amandavi.

Explicatio iconum.

Tab. 118. f. 1. CARISSA cirandas. (a) Ramulus solutus. (b) Flores. (c) Corolla aperta. (d) Fadem cum staminibus eminentibus. (e, f) Calyx, pistillum. (g) Fructus integer. (h) Idem dissectus. (i) Semen.

Tab. 118. f. 2. CARISSA spinarum.

331. G Y N O P O G O N.

Charact. essent.

CAL. 5-fidus, persistens. Cor. infundibuliformis, sub fauce ventricosa, intus villosa. Bacca pedicellata : nucleo subbiloculari.

Charact. nat.

Cal. monophyllus, minimus, semiquinquesidus, persistens : laciniis linearibus ; acutis, erectis.

Cor. monopetala, infundibuliformis. Tubus cylindraceus, calyce longior, sub apice ventricosus, ad faucem coarctatus. Limbus planus, quinquepartitus : laciniis ovatis.

Stam. Filamenta quinque, brevissima, tubo supra medium inferta. Antherae erectae, lineares, intra tubum.

Pist. Germen superum, ovatum. Stylus filiformis ; tubo brevior. Stigma globosum, didymum, apice villosum.

Peric. Bacca pedicellata, ovato-globosa, coriacea, fæta nuce cartilaginea, subbiloculari.

Sem. subsolitaria, sæpe abortiva.

Conspectus specierum.

* GYNOPOGON (stellatum) - foliis verticillatis, ternis, lanceolatis. Forst. ex inf. societ. & amic.

* GYNOPOGON (*alyxie*.) à feuilles verticillées cinq à cinq, ovoïdes. *Diâ. ibid.*

* GYNOPOGON (*grim pant*) à feuilles opposées, ovales, nerveuses. *Diâ. ibid. Absque descript.*

Explication des fig.

Pl. 118. GYNOPOGON d'après M. Forster. (a) Fleur entière. (b, c) Corolle ouverte. (d, e) Etamine séparée. (f, g) Pistil. (h) Stigmate grossi. (i) Ovaire coupé. (l) Baie entière. (m) La même coupée transv.

332. DENTELLE.

Charact. essent.

CAL. supérieur. Cor. infundibulif. 5-fide à découp. à 3 dents. Capf. couronnée; 2-locul.

Charact. nat.

Cal. supérieur, quinquesfide : à découp. subulées, droites.

Cor. monopétale, infundibuliforme, plus longue que le calice. Tube s'élargissant insensiblement en un limbe quinquesfide, ouvert : à cinq découp. pointues, partagées en 3 dents, dont celle du milieu est plus allongée.

Etam. Cinq filaments, courts, subulés, attachés à la base du tube. Anthères oblongues.

Pist. Ovaire inférieur, arrondi, velu. Style court, un peu épais. Deux stigmates ouverts, plus épais & plus longs que le style.

Péric. Capsule globuleuse, velue, couronnée par le calice, biloculaire.

Sem. nombreuses, ovales.

Tableau des espèces.

2445. DENTELLE rampante *Diâ. 2. p. 270.*
E. n. la Nouvelle-Calédonie.

Explication des fig.

Pl. 118. Fructification de la Dentelle, d'après Forster. (a, b) Fleur de grand. nat. (c) La même grossie du double. (d) Corolle très-grossie & coupée. (e) Etamine. (f) Pistil. (g) Fruit de grandeur nat. (h) Le même grossi & coupé.

* GYNOPOGON (*alyxia*) foliis verticillatis, quinis obovatis. *Forst. Ex ins. norfolciæ.*

* GYNOPOGON (*scandens*) foliis oppositis, ovatis, costatis. *Forst. Ex insulis societatis.*

Explicatio iconum.

Tab. 118. GYNOPOGON ex D. Forster. (a) Flos integer. (b, c) Corolla aperta. (d, e) Stamen separatum. (f, g) Pistillum. (h) Stigma auctum. (i) Germen dissectum. (l) Bacca. (m) Eadem dissecta.

332. DENTELLA.

Charact. essent.

CAL. superus. Cor. infundibuliformis, 5-fida : laciniis 3-dentatis. Capf. coronata; 2-locul.

Charact. nat.

Cal. superus, quinquepartitus : laciniis subulatis, erectis.

Cor. monopetala, infundibuliformis, calyce longior. Tubus sensim ampliatus in limbum quinquesfidum, patentem : laciniis acutis, tridentatis : denticulo medio productiore.

Stam. Filamenta quinque, brevia, subulata, ad basim tubi inserta. Anthæræ oblongæ.

Pist. Germen inferum, subrotundum, villosum. Stylus brevis, crassiusculus. Stigmata duo, stylo crassiora longiora patentia.

Peric. Capsula globosa, villosa, calyce coronata, bilocularis.

Sem. Plurima, ovata.

Conspectus specierum.

2445. DENTELLA repens.
E Nova Caledonia. *Forst. gen. t. 13.*

Explicatio iconum.

Tab. 118. Fructificatio Dentellæ, ex D. Forster. (a, b) Flos magnitudine naturali (c) Idem duplo auctus. (d) Corolla multoties aucta & dissecta. (e) Stamen. (f) Pistillum. (g) Fructus magnit. nat. (h) Idem auctus & dissectus.

333. V O M I Q U E.

Charact. essent.

COR. tubuleuse, 5-fide. Baie 1-loculaire, polysperme : à écorce presque ligneuse, fragile.

Charact. nat.

Cal. court, monophylle, campanulé, quinqueside, droit, caduc.

Cor. monopétale, infundibuliforme. Tube cylindracé, plus long que le calice. Limbe quinqueside, ouvert.

Etam. Cinq filamens, de la longueur de la corolle. Anthères oblongues.

Pist. Ovaire supérieur, arrondi. Style simple, plus long que les étamines. Stigmate un peu épais.

Péric. Baie globuleuse ou ovale, grande, uniloculaire, pulpeuse : à écorce presque ligneuse, cassante.

Sem. nombreuses, orbiculées, ou irrégulièrement anguleuses ; cornées, un peu grandes.

Tableau des espèces.

2446. VOMIQUE officinale. Dict.

V. inerme, à feuilles ovales, pétiolées ; cimes subterminales.

L. n. l'Inde. $\bar{\eta}$ *F. opposées, arrondies-ovales.*

2447. VOMIQUE bois-de-coulevre.

V. inerme, à feuilles ovales, pointues, presque sessiles ; vrilles simples.

L. n. l'Inde $\bar{\eta}$ *Cime lat. pauciflore,*

2448. VOMIQUE potatôire.

V. inerme, à feuilles ovales-pointues, pétiolées ; corolles velues à l'orifice.

L. n. l'Inde. $\bar{\eta}$ *Cimes term. Baies petites, 3-spermes.*

2449. VOMIQUE épineuse. Dict.

V. à rameaux épineux ; feuilles ovoïdes ; corolles barbues à l'orifice, à peine plus longues que le calice,

333. S T R Y C H N O S.

Charact. essent.

COR. tubulosa, 5-fida. Bacca 1-locularis, polysperma : cortice sublignoso, fragili.

Charact. nat.

Cal. brevis, monophyllus, campanulatus, quinquesidus, erectus, deciduus.

Cor. monopetala, infundibuliformis. Tubus cylindraceus, calyce longior. Limbus quinquesidus, patens.

Stam. Filamenta quinque, longitudine corollæ. Antheræ oblongæ.

Pist. Germen superum, subrotundum. Stylus simplex, staminibus longior. Stigma crassiusculum.

Peric. Bacca globosa, vel ovata, magna, unilocularis, pulposa : cortice fragili, sublignoso.

Sem. Plura, orbiculata aut irregulariter angulata, cornea, majuscula.

Conspectus specierum.

2446. STRYCHNOS nux vomica. T. 119.

S. inermis, foliis ovalibus, petiolatis ; cymis subterminalibus.

Ex India. $\bar{\eta}$ *Rheed. mal. 1. t. 37.*

2447. STRYCHNOS colubrina.

S. inermis, foliis ovatis, acutis, subsessilibus ; cirrhis simplicibus.

Ex India. $\bar{\eta}$ *Rheed. mal. 8. t. 24.*

2448. STRYCHNOS potatoria.

S. inermis, foliis ovato-acutis, petiolatis ; corollis fauce villosis.

Ex India. $\bar{\eta}$ *L. f. suppl. Rheed. mal. 7. t. 5.*

2449. STRYCHNOS spinosa.

S. ramis spinosis, foliis obovatis ; corollis fauce barbatis, vix calyce longioribus,

PENTANDRIE MONOGYNIE.

L. n. Madagascar. *h F. quinquenerves. Baie grosse, polysp. à pulpe d'une acidité agréable. Vontaca. Flacourt. p. 121. n°. 13.*

2450. VOMIQUE de Saint-Ignace. Di&.

V. inerme, à rameaux sarmenteux, grimpans; fruit pyriforme.

L. n. les Indes orient. h Fève de Saint-Ignace.

Cor. tubuleuse, fort longue.

Explication des figures.

Pl. 119. VOMIQUE officinale. (a) Corymbe florifère. (b) Fleur séparée. (c) Rameau fructifère. (d) Baie jeune. (e) La même coupée transversalement & plus grande. (f) Semences.

334. COQUEMOLLIER.

Chara&. essent.

COR. campanulée, courte, à cinq lobes. Caps. globuleuse, cortiqueuse, 1 locul. polysperme, int. un peu pulpeuse.

Chara&. nat.

Cal. monophylle, petit, persistant, semiquinqueside : à découp. oblongues, ciliées.

Cor. monopétale, campanulée. Tube de la longueur du calice. Limbe partagé en cinq découpures oblongues, demi-ouvertes.

Etam. Cinq filamens, plus courts que la corolle, inférés au-dessous du milieu du tube à une membrane qui en garnit int. le fond. Anthères acuminées.

Pist. Ovaire supérieur, arrondi. Style épais de la longueur des étamines. Stigmate obtus, perforé.

Peric. Capsule globuleuse, cortiqueuse, grande; uniloculaire, ne s'ouvrant point, un peu pulpeuse intérieurement : à écorce fragile.

Sem. nombreuses, ovales-oblongues, luisantes, attachées à un placenta charnu, central.

Tableau des espèces.

2451. COQUEMOLLIER d'Am. Di&. 2. 99.

L. n. Saint-Domingue. h Tige droite, très-simple, feuillée au sommet.

PENTANDRIA MONOGYNIA. 39

E Madagascar. *h Pluk. t. 170. f. 4. Bacca globosa, maxima; pulpâ acido dulci gratissimâ. Sem. globoso-compressa; margine sub-acuto.*

2450. STRYCHNOS Ignatia.

S. inermis, ramis sarmentosis, scandentibus; fructu pyriformi.

Ex Indiis orient. h Ignatia amara. L. f. suppl.

Gartn. 2. 477. t. 179.

Explicatio iconum.

Tab. 119. STRYCHNOS nux vomica. (a) Corymbus florifer. (b) Flos separatus. (c) Ramus fructifer. (d) Bacca junior. (e) Eadem separata, transversim secta. (f) Semina. *Ex Rheed. & herb.*

334. THEOPHRASTA.

Chara&. essent.

COR. campanulata, brevis, 5-loba. Caps. globosa, corticosa, 1-locularis, polysperma, intus subpulposa.

Chara&. nat.

Cal. monophyllus, parvus, persistens, semiquinquesidus, laciniis oblongis ciliatis.

Cor. monopetala, campanulata. Tubus longitudine calycis. Limbus quinquepartitus : laciniis oblongis, erecto-patentibus.

Stam. Filamenta quinque, corolla breviora, infra medium tubi, membranæ fundum interne cingenti inserta. Anthæræ acuminatæ.

Pist. Germen superum, subrotundum. Stylus crassus, longitudine flaminum. Stigma obtusum, perforatum.

Peric. Capsula globosa, corticosa, magna, unilocularis, non dehiscens, intus subpulposa : cortice fragili.

Sem. plura, ovato-oblonga, nitida, receptaculo centrali carnofo affixa.

Conspectus specierum.

2451. THEOPHRASTA Americana. T. 119.

E Domingo. *h Burm. Amer. t. 126. Swartz. Obs. p. 58.*

Explication des fig.

Pl. 119. COQUEMOLIER d'Amérique. (a) Fleur entière. (b) Corolle séparée. (c, d) Calice, pistil. (e) Pistil séparé. (f) Capsule entière. (g) La même coupée transversalement avant sa maturité. (h) Semences séparées. (i) Tige garnie de feuilles & de fleurs. (l) Feuille séparée, une fois plus petite que nature.

335. ANASSER.

Charact. essent.

COR. urcéolée, à cinq lobes, velue int. Stigmate didyme. Capf. oblongue, 2-valve, 2-locul.

Charact. nat.

Cal. monophylle, petit, un peu campanulé, quinquefide, persistant.

Cor. monopétale, presque hypocratérisforme, velue intérieurement. Tube ovale, plus long que le calice. Limbe quinquefide, ouvert : à découp. ovales-pointues, un peu concaves.

Etam. Cinq filaments, très-courts, épais, attachés au tube. Anthères sagittées; droites, incluses.

Pist. Ovaire supérieur, ovale. Style cylindrique, un peu épais, de la longueur du tube. Stigmate en tête, didyme.

Péric. Capsule oblongue, biloculaire, bivalve : à bords des valves courbés en-dedans.

Sem. nombreuses, globuleuses, attachées à deux réceptacles oblongs, centrales.

Tableau des espèces.

2452. ANASSER de Bourbon. Dict. suppl.
A. à feuilles ovales, un peu obtuses; corymbes latéraux.
L. n. l'île de Bourbon. $\bar{\eta}$ Arbrisseau à feuilles opposées.

2453. ANASSER des Moluques. Dict. suppl.
A. à feuilles lancéolées, pointues; corymbes subterminaux.
L. n. les Moluques. $\bar{\eta}$ Je n'ai point vu cette plante.

Explicatio iconum.

Tab. 119. THEOPHRASTA Americana. (a) Flos integer. (b) Corolla separata. (c, d) Calyx, pistillum. (e) Pistillum separatum. (f) Capsula integra. (g) Eadem ante maturitatem transversim secta. (h) Semina soluta. (i) Caulis foliis floribusque onustus. (l) Folium separatum, magnitudine naturali duplo minor. Fig. ex Plum. & ex herb.

335. ANASSER.

Charact. essent.

COR. urceolata, 5-loba; intus villosa. Stigma didymum. Capf. oblonga, 2-valvis, 2-locul.

Charact. nat.

Cal. monophyllus, parvus, subcampanulatus, quinquefidus, persistens.

Cor. monopetala, subhypocrateriformis, intus villosa. Tubus ovatus, calyce longior. Limbus quinquefidus, patens: laciniis ovato-acutis, subconcavis.

Stam. Filamenta quinque, brevissima, crassa, tubo inserta. Antheræ sagittatæ, erectæ, inclusæ.

Pist. Germen superum, ovatum. Stylus teres, crassiusculus, longitudine tubi. Stigma capitatum, didymum.

Peric. Capsula oblonga, bivalvis, bilocularis: valvularum marginibus introflexis.

Sem. plurima, globosa, receptaculis 2 oblongis, centralibus affixa.

Conspectus specierum.

2452. ANASSER Borbonica.
A. foliis ovatis, obtusiusculis; corymbis lateralibus.
Ex Borbonia. $\bar{\eta}$ Commerf. Anasser. Juss. Gen. 150.

2453. ANASSER Moluccana.
A. foliis lanceolatis acutis; corymbis subterminalibus.
Ex Moluccis. $\bar{\eta}$ Cortex fatidus. Rumph. amb. 7. pag. 12. t. 7.



J. E. de Seve Del.

Benard Direxit .

Portulaca.




Talinum.



J. E. de Seve Del

Benard Drexler




P. J. Redouté Del.

Benard Dixerit.

Halesia.



Evodia.



Poirier Del.

Benard Dirécit

Garcinia, Mangoustan.




Forsier Del.

Benard Dircat.

Caßipourea.



Blakea.



Forsier Del.

Benard Duxed.

Crenea.



Ginora.



Cuphea.



Fossier Del.

Bevard. D'extr.


Lythrum, Salicaire.



Fossier Del.

Benard Dixerit

Helioarpus.



Agrimonia, Aigremoine.



Possier Del.

Benard Diracil.



J. F. de Sève Del.

Benard Diracell.

Euphorbia.



J.E. de Sève Del.

HISTOIRE NATURELLE, Botanique.

Benard Doreur.

Blackwellia.



Audebert Del.

Benard. Diracit


Glinus.



Sempervivum. Joubarbe.



Cactus. Cactior.



Forsier Del.

Benard Diresit.

HISTOIRE NATURELLE, Botanique.

Punica , Grenadier.



J. E. de Seve Del.

Benard Dir. exilt

Psidium, Goyavier.



Fosberg Del.

Benard Dirigit

Caryophyllus. Geroflier.



J.E. de Sève Del

Benard Dixerit

Eugenia Jambosier.

1.



2.




Fossier Del.

Benard Diract.

Myrtus.



Foetidia.



Boissier Del.

Benard Dixerit

Sonneratia .



Philadelphus .
Seringa .



J. E. de Saxe Del.

Beard Direct.

Metrosideros.



Fossier Del.

Benard Diravit.

Eucalyptus.



P.J. Redouté Del.

Benard Diravit.


HISTOIRE NATURELLE, Botanique.



Leptospermum.



Fabricia.



Scopolia.



Tourouha,



Fossier Del.

Benard Drocet.



Mentzelia.



J. E. de Seve Del.

HISTOIRE NATURELLE, Botanique.

Benard Diracit

Ioaza, Loaze.



J. E. de Seve Del.

Bénard Duxoit

Grangeria.



Moquilea.




Fossier Del.

Benard Drexel.

Chrysobalanus.



Plinia.



J. E. de Seve Del.

Benard Dirigit.

Parinarium.



Forster Del.

Benard Durand.



Amygdalus.



Fossier Del.

Benard Dirigit.

Armeniaca. Abricotier.



Leissier Del.

Benard Diract.

Prunus. Prunier.



Fossier Del.

HISTOIRE NATURELLE, Botanique.

Benard Doreil.

226.

Cratægus, Alsier.



J. E. de Seve Del.

Benard Dircxit.



Sorbus, Sorbier.



Sesuvium.



J. B. de Seve Del.

Bouard Dixerit

Pyrus, Poirier.




Fossier Del.


Benard Diract

Mespilus, Neflier.

1.



2.





Tetragonia.



Aizoon.



Audebert Del.

Benard Dixerit.



Mesembryanthemum.



J. E. de Sève Del

Benard Dixerit





J. E. de Seve Del.

Benard Diracit.

Rosa

1.



2.



Fossier Del.

Benard Duxit.




Rubus. Ronce.




J. B. de Seve Del

Benard Drexel

Fragaria. Fraisier.



Potentilla.




Fossier Del.

Benard Dir. ex. lit.

Geum, Benoîte.



Dryas.




Audebert Del.

Benard Diracut.

Tormentilla.



Comarum.



Fassier Del.

Benard Diravit.



Calycanthus,



J. E. de Seve Del.

Benard Dir.




Capparis. Caprier.

Fossier Del.


Benard Diracit.

HISTOIRE NATURELLE, *Botanique.*

Marcgravia.



Norantea.



Forster Del.

Benard Duxit.

Actœa.



J. P. Redouté Del.

Benard. Dir. exc.

Sanguinaria .



Podophyllum .



André Del.

Bernard Dirac

Chelidonium, *Chélidoine*.



Fossier Del

Benard D'excult.

Papaver.
Pavot.



Fossier Del.

Benard Dircxit

Argemone.



Sarracenia.




J. E. de Seve Del.

Benard Dixcit.

Nymphaea.



Nelumbium.




J. E. de Sève Del.

Benard Diracil.

Cavanillea mabolo.



Paralea.



Torrer Del.

Benard Dirigit.

Symplocos.



J. E. de Seve Del.

Benard Drexel.

Tanabea.



Fossier Del.

Benard Diracit.

Rheedia, Cyrojer.




Fournier Del.

Benard Diract.



Mammea ,



Rossier Del.

Bernard Pinx.

Calophyllum .



Elæocarpus .



Fossier Del.

Benard Diracul.

Singana.






Possira.




J. E. Le Seve Del.

Benard Diravit.

Tournatea.



Houmيريا.



J. E. de Sève Del.

Benard Dirigit

Soramia.




Fosier Del.

Benard Direct.

Mahurea .



Banara .



Fossier Del.

Bernard. Direct.

Prockia, Proquier.

3.



P. J. Redoute Del.

Benard Diresit.


HISTOIRE NATURELLE, Botanique.



Ludia. Ludier.



Trewia.



J. E. de Sere Del.

Bernard Duvet



Tilia, Tilleul.




Grewia.



Sparmannia.



Muntingia.



J. B. de Seve Del.

Benard Dircail

Bixa. Rocouier.




Sloanea. Quapalier.



Fossier Del

Benard Diracit


Apeiba.



Oncoba.
Rimbot.



Vantanea.



Fossier Del

Benard Dorexit

Ochna.




P. J. Redoulé Del.

Benard Drexel.



Lagerstromia.

1.



2.





Thea, The'.



P. J. Redoute Del.

Benard Dir. et.

Delima.



Vateria.



Fossier Del.

Benard Dixerit



Lecythis Quatele'.

Fossier Del.

Benard Diract

Cistus, Ciste.



J. E. de Seve Del

Bonard Drexel


Córchorus, *Corète*.

H. J. Redouté Del.

Benard Dixerit.



Curatella.



Ablania.



Possier Del.

Benard Diract

Mourera.



Fothergilla.



J. E. de Saxe Del.

Benard Diracil.

Pœnia, Pivoine.

J. E. de Sene Del.

Benard Direxit

Delphinium,
Dauphinelle.



Aconitum.




J. E. de Seve Del.

Benard Dorez

Homalium, Acomat.



Euryandra.



Audebert Del.


Benard Diravit.



Enourea.



Napimoga.



Fossier Del.

Benard Dirigit



Tetracera.



Wahlbomia.



P. J. Redoute Del.


Benard D'excit.

Pekea.

1.



2.



Cimicifuga.



F. J. Redouté Del.

Benard Diravit.

Aquilegia Ancolie.*Nigella.*

Fossier Del.

Benard Dirigit

Reaumuria.



Stratiotes.



J. F. de Sève Del.


Benard Diravit.

Magnolia.



Fossier Del.

Benard Diracit



Marechal Del.

Benard Dixerat.

Dillenia.



J. F. de Sève Del.

Benard Drexil.

HISTOIRE NATURELLE, Botanique.

Michelia.



Illicium.




P. J. Redoute Del.

Benard Dirigit

Drimys.




Anona. Corossol.



P. J. Redouté Del.

Benard Dirazit



Fossier Del.

Benard Direxit.


Anemone.




Fossier Del.

Benard Diracit.

Clematis.




Thalictrum. *Pigamon.*




J. E. de Seve Del.

Benard Direxit.

Adonis.




Ranunculus.




Fossier Del.

Benard Dirigit.

Trollius.



Helleborus, *Hellebore.*




Fossier Del.

Benard Dixxit.

Caltha, Populage.



Hydrastis.



Fossier Del.

Benard Diracit

ART. V. *Vol de Bois dans les Chantiers.*

On distingue, dans notre Jurisprudence, parmi ces Vols, ceux qui seroient faits à des Blanchisseuses & Ouvrières en Linge qui auroient étendu des Toiles & Linges appartenans à autrui, pour les blanchir & faire sécher, de ceux qui seroient faits aux Particuliers même à qui ces Toiles &

Linges appartiendroient. Ce premier cas seulement, que ces réputés faits contre la *for. publi.* deviennent par conséquent injuste du Fouet, du Carcan, &c. des trois ans, qui est attachée à cette qualité.

IL en faut dire de même de ce Vol, que des précédens. Nous ne distinguons point, à cet égard, les Bois de *chauffage*, de ceux de *charpente*. Nous ne distinguons point non plus, si le Vol en a été fait de jour ou de nuit. En quoi nous ne suivons point la disposition de la Coutume de Bretagne, qui n'admet la pourluite extraordinaire que

pour les Vols de Bois de ch
pour ceux qui ont été faits par
(1) Bois pris outre la volonté de ci
ne porte crime, s'il n'étoit *charpenté*
à édifier, ou débordé de *nuit*, ou fêlé,
merché, ou bois qui porte fruit, ou
pris herbérement & prochainement
pour la décoration d'icelle. *COU.* de

ART. VI. Des Vols d'Arbres & de Fruits dans les Jardins &

L faut d'abord distinguer, quant à la Peine, le Vol des Fruits, de ceux qui le font des Arbres même qui les portent; ces premiers sont sans contredit moins punissables que les derniers; tant parce qu'ils causent moins de préjudice, que parce qu'ils peuvent n'avoir été excités que par le besoin ou par la gourmandise, comme lorsqu'ils sont faits par des Écoliers & des jeunes gens: au lieu que les derniers ne sont faits ordinairement que dans la vue d'en tirer un profit particulier, ou de nuire à des Tiers, par un esprit de vengeance ou de ressentiment. Ainsi, tandis qu'il n'y auroit lieu, par rapport aux Vols des *Fruits*, qu'à de simples Peines pécuniaires, qui pourroient être prononcées par la voie civile (hors néanmoins le cas où ce Vol auroit été fait nuitamment, & que l'objet en seroit considérable) la poursuite extraordinaire a toujours lieu dans le cas des Vols d'*Arbres*, soit fruitiers, soit même qu'ils ne seroient deff-

nés qu'à servir d'ornement. I
fur ce dernier point, un cé
rapporté au Journal du Palais (
dammé au Bannissement un C
de Normandie, pour avoir coi
Arbres dans l'avenue d'un Cl
aussi la disposition de l'art. 62
tume de Bretagne que nous ven
A l'égard des Arbres volés dan
du Roi ou des Particuliers,
ment des condamnations d'Ar
noncées pour la première fois
qui les volent, comme nous le
traitant des délits de Police dan

ART. VII. Des Vols d'Echalats & de jeunes Seps dans les V

Ce Crime est aussi mis , par les Arrêts , au nombre des Vols contre la *Roi publique*, & punissable par conséquent de la Galères de trois ans ; sur-tout si ce Vol est fait pendant que les Septs de richesse des pays où elles font



39088006379051